



REVISTA DAS REVISTAS



Lemos nas Publicações Medicas (Março 1931)

A dôr xyphoidiana e o seu valor diagnostico.

A. de Silva Mello — Archives des Maladies de l'Appareil Digestif et des Maladies de la Nutrition, commentado por L. Rivet en la Presse Médicale, n.º 93, 3 dezembro 1930.

Em linhas geraes é assim commentado o trabalho de Silva Mello, que é medico no Rio de Janeiro:

A dor provocada pela apalpação ou percussão do xyphoide é um symptoma importante das lesões localizadas na porção superior do abdomen e, particularmente, das ulceras do duodeno.

Este ponto doloroso, que se encontra num grande numero de casos, tem, sobre todos os outros pontos abdominaes, a vantagem de ser o mais objectivo e de pesquisa mais facil.

Póde servir de base para a apreciação da evolução da doença e, sobretudo, dos resultados therapeuticos. Sua intensidade apresenta uma evolução parallelá ás melhoras e agravamentos do estado do doente. Póde demonstrar os bons ou os maus resultados do tratamento prescripto.

O seu desaparecimento é dos mais variaveis: elle cede, ás vezes, rapidamente. Em outros casos, persiste durante muito tempo, só diminuindo ou desaparecendo após semanas e, ás vezes, meses de tratamento.

A sua localização é precisa. A sua sensibilidade é, muitas vezes, tal que, espontaneamente, elle chama a attenção do proprio doente.

Ainda mais. Póde constituir um dos symptomas mais importantes da molestia, adquirindo assim um alto valor diagnostico e podendo trazer a descoberta de uma affecção determinada da qual é, por vezes, a unica manifestação clinica.

Lemos nas Publicações Medicas (Março 1931)

A proposito do tratamento das nephritis syphiliticas sub-agudas. *Theobat e Laquenán* — Le Bulletin Médical, 26 de julho de 1930, citado por R. C. Bizzozero in El Día Médico, Buenos Aires, anno III, n.º 18, dezembro de 1930.

Relatam a seguinte observação: individuo de 24 annos que ingressa no hospital por edemas importantes da face e membros inferiores: oliguria (250 a 350 cc.); diminuição da eliminação de chloretos: albuminuria alta (3 a 12 grammas); uréa sanguinea 0,54 por mil; tensão arterial normal; reacções positivas de Hecht, Wassermann. Jacobsthal, francas no sangue.


E' submettido, sem resultado, ao tratamento commum das nephritis agudas.

Institue-se, então, um tratamento especifico com cyaneto de mercurio (1 cc. diario); após 12 injeccões nenhuma melhora. Os edemas augmentaram, persistiu a oliguria e a albuminuria, elevando-se a uréa sanguinea.

Faz-se então uso do bismutho com mau resultado: augmento dos edemas e da albuminuria (21 grammas) e da uréa (0,90), apparecimento de uma crise de uremia, derrames pleuraes, ruido de galope, apre-

OPTICA MODERNA FOERNGES IRMÃOS ANDRADAS 1504 - PORTO ALEGRE

ESPECIALISTAS NO PREPARO DAS LENTES RE-
CEITADAS PELOS SNRS. MEDICOS-OCULISTAS



COMPLETO SORTIMENTO de LENTEs BI-FOCAES

que com-
binam
dois focos em uma só lente; um para longe e
outro para perto.

Lentes ZEISS-PUNKTAL

que produzem imagens nitidas em todas as di-
recções que se olhe.

LENTEs CROOKES

que elimi-
nam prati-
camente os raios Ultra-Violeta e reduzem a in-
tensidade da luz.

:: Thermometros Casella - Olhos artificiaes ::