HELMINTOSES DO MUNICÍPIO DE TÔRRES E DECORRENTES CONCEITOS PROFILÁTICOS*

RAUL F. DI

No estado atual da ciência é inconcebível que o problema das helmintoses, que deveria estar há muito tempo superado, ainda possa figurar, descabidamente, como assunto em um conclave de significativa expressão científica.

A polihelmintose, entretanto, constituiu em muitas regiões, grave entrave profilático, consequência de um misto de desídia e ignorância do próprio homem.

A educação sanitária ainda não atingiu ou não modificou, por motivos óbvios, uma situação atávica ou retrógrada de primitivismo anti-higiênico.

Qualquer pesquisa que se realiza no laboratório, relacionada aos fenômenos biológicos que envolvem a coletividade, não pode prescindir do estudo integral e complexo das pesquisas de campo, das condições intrínsecas do habitáculo, dos fatores intercorrentes ou circunstanciais, do parasito e do homem, sua predestinação e constante vítima.

O estudo dos fenômenos nosológicos, particularmente das doenças de massa, como no caso das helmintoses, requer, precisamente, a análise meticulosa dos fatores ambientais, sociais, econômicos e psicológicos relacionados a todos grupos etários.

A omissão de tais elementos, além das falhas técnicas, é a causa principal do fracasso de medidas profiláticas inadequadamente empreendidas como atestam os exemplos do passado.

Justifica-se, assim, o conjunto das considerações que consignei em trabalhos anteriores e dispensadas, por êste motivo, de repetição.

Consigno, apenas, a incidência comparada das helmintoses em circunstâncias diferentes e decorrentes conceitos profiláticos.

COMPLEXO FENÔMENO SÓCIO-PARASITÁRIO

Destaco das minhas observações anteriores um fato de real importância nosológica que atualmente se repete, con-

solidando a interpretação, ora renovada, em torno de um fenômeno que eu denomino, sócio-parasitário consubstanciado nas conclusões do presente trabalho.

Detenho o privilégio de poder estabelecer, com observação concreta, o paralelo do parasitismo helmíntico em Tórres há precisamente 40 anos com a situação atual, em condições dificilmente igualladas em outras regiões, sob idênticas oportunidades por outrem.

Antes, com 100% de helmintoses eram freqüentes os casos clássicos facilmente diagnosticados à distância, com predominância da ancilostomose, como atestam os dados da estatística anexa.

Recentemente, em dezembro de 1969, no Cantão, zona periférica da cidade de Tórres, a incidência foi de 100%.

Entretanto, os casos de grande intensidade clínica registrados no passado, são atualmente menos freqüentes. Permanecem as formas frustas ou mais discretas determinando uma situação paradoxal diante do evidente parasitismo.

Êste aspecto esdrúxulo e enganador da endemia helmíntica deve-se aos seguintes fatores: 1º) Influência polimorfa do progresso de maneira marcante após a inauguração da rodovia federal; 2º) Melhores condições do padrão de vida e, corolariamente, da alimentação; 3º) Interferência benéfica do turismo; 4º) Instrução mais adiantada e difundida; 5º) Papel importante da imprensa falada e escrita; 6º) Penetração salutar da televisão nos longínquos rincões; 7º) Melhor assistência médico-hospitalar; 8º) Amparo sanitário oficial; 9º) Contagiantes medicinação familiar; 10º) Estimulação do ambiente pela motivação sócio-sanitária.

Os dados estatísticos de 1922 a 1969, referentes à cidade e interior do município de Tórres, evidenciam as asserções que corroboram os conceitos profiláticos em torno da intérmina endemia helmíntica.

Como fatores negativos persistem: 1º) Falta de assistência médica nos dis-

* Trabalho apresentado no VI Congresso da Soc. Brasileira de Medicina Tropical, de 22 a 25-2-1970, em Pôrto Alegre.

tritos, pelo menos por intermédio de organizadas equipes volantes; 2º) Ineficácia das oscilantes medidas profiláticas dependentes dos orçamentos deficitários; 3º) Substituição dos processos atuais pela profilaxia eclética, com a motivação de todos os recursos locais de auxílio dos poderes públicos a exemplo do que realizou no município de Canela; 4º) Reativação da educação sanitária de maneira contínua como obstinada e persistente é a expoliação do helminto.

SITUAÇÕES MESOLÓGICAS ADVERSAS SOB IDÊNTICOS FATÔRES NOSOLÓGICOS

Dados estatísticos recentes e seguros, permitem-me comparar situações mesológicas adversas sob idênticos fatores nosológicos ambas com manifestações mórbidas equivalentes.

Como justificativas básicas apresento duas regiões diametralmente opostas: a serra representada por Canela, estação repousante de veraneio e o litoral de Torres, a movimentada zona de férias.

A primeira de grande altitude, de predominante clima ameno e sêco, com baixa temperatura na estação invernos,

de constantes geadas e periódicas nevadas, topografia acidentada, com domínio de declives, composição geológica de origem rochosa, densidade florestal, tendo como símbolo o pinheiro, onde atua progressista colonização alemã sob a influência da força indômita do progresso.

A segunda ao nível do mar, de clima estável e úmido, de temperatura moderada, sem a agressividade habitual do inverno, de topografia relativamente plana, de composição geológica de origem marítima e corolariamente arenosa, vegetação, por adaptação climática, aproximadamente de outras latitudes do País, colonização igualmente alemã, porém estagnada longo tempo pelas dificuldades de comunicações.

Desta inicial comparação destacam-se fatores de ordem psicológica ou sócio-econômico aliás importantes na concepção moderna da profilaxia do que da epidemiologia no sentido estrito dos antigos sanitaristas.

Os levantamentos helmintológicos realizados apresentaram surpreendentes resultados.

Os dados estatísticos referentes ao município de Canela obtidos de 30 de março a 10 de abril de 1967, são:

<i>Localidades</i>	<i>Helmintoses em geral</i>	<i>Ancilostomese</i>
Chapadão	96,0%	58,3%
Galle	95,0%	76,7%
Amoreira	89,0%	71,1%
São João	79,0%	28,2%
Limeira	62,0%	18,0%
Banhado Grande	58,0%	5,2%

Incidência dos helmintos:

<i>A. lumbricoides</i>	55,0 %
<i>Ancilostomídeos</i>	46,0 %
<i>T. trichiura</i>	13,0 %
<i>Taenia sp</i>	1,34%
<i>E. vermicularis</i>	0,50%

Média geral de infestação ... 82,7%

As comparações nosológicas não são padronizadas como a Biologia não é universalmente uniforme.

Assim, em Criúva, distrito de Caxias do Sul, de latitude correspondente e de idênticas condições mesológicas e equivalentes composições geológicas de Canela, seguindo a mesma técnica laboratorial, os resultados mostraram diversidade estatística.

Distrito de Criúva

Sede e arredores

	Nº	%
<i>A. lumbricoides</i>	117	55,7
<i>T. trichiura</i>	2	0,9
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	9	4,2
Ancilostomídeo	1	0,4
Negativos	81	38,5
t o t a l	210	

Positivos	129	64,4%
Negativos	81	38,6%

Povoação da Mulada

Grupo Escolar «João Pilati»

Positivos	63	74,0%
Negativos	22	26,0%

Grupo Escolar «Irmão Pedro»

Positivos	59	83,0%
Negativos	12	17,0%

Em Criúva observa-se a predominância do *Ascaris lumbricoides* em contraste com a baixa incidência do *Trichuris trichiura*.

Os exames procedidos não revelaram casos autoctones de ancilostomose.

Tôrres

Para a devida comparação os dados referentes às helmintoses do município de Tôrres são:

Fundação Rockefeller	1922	100,0%
Divisão de Organização Sanitária	1955	100,0%
Raul F. di Primio	1929	100,0%
Raul F. di Primio — S. S. de Indústria	1953	93,0%
Raul F. di Primio — G. E. Marcílio Dias	1953	99,0%
Raul F. di Primio — G. E. Marcílio Dias	1964	100,0%
Raul F. di Primio — Cantão	1969	100,0%

Os exames procedidos em crianças de um mês a 7 anos deram 82,5% de positivos, em 1965.

Dados estatísticos do interior do município de Tôrres, segundo Raul F. di Primio:

Morro Azul	1949	100,0%
Morro Azul	1967	86,0%
Morro Azul	1968	72,6%
Morro Azul	1969	70,0%
Três Cachoeiras	1968	77,0%
Colônia São Pedro	1969	67,1%
São Braz	1969	67,1%

O trabalho realizado

Os dados estatísticos do presente trabalho, referentes ao município de Tôrres, são significativos e traduzem a continuidade da endemia helmíntica.

Em síntese, a campanha profilática, em prosseguimento consta de: levantamento helmintológico; exames clínicos; medicação de acôrdo com os resultados coprológicos; educação sanitária por meio de conferências e palestras acompanhadas sistematicamente de projeções luminosas nos salões paroquiais dos respectivos distritos, nos clubes e sociedades locais, nos estabelecimentos de ensino, nas reuniões de pais e mestres; palestras e entrevistas radiofônicas; conselhos individuais, etc.

Dos polimórfos meios de educação sanitária ressalta notar que os cartazes contendo pertinentes conselhos sobre a endemia, com adequadas ilustrações coloridas com previsto rodízio entre os colégios, nas reuniões sociais e religiosas e outras entidades do Morro Azul e circunvizinhanças, apontam o contraste entre a morbidez e a realidade do progresso em um ambiente de inigualável beleza natural onde a inferioridade do homem doente é flagrante e deprimente diante de uma causa fãcilmente removível, mas ainda obstinadamente persistente.

Os cartazes atingem sempre magníficos êxitos quando são adequadamente confeccionados de acôrdo com as motivações locais como realizei no Morro Azul.

Aspecto inédito da educação sanitária

Destaco, baseado na educação sanitária, que reputo o elemento essencial na profilaxia em todos os setôres de Saúde Pública, uma iniciativa inédita.

Erigi, à guisa de indicador profilático, no alto de um poste, entre a igreja e o salão paroquial, no distrito do Morro Azul, ponto inicial da profilaxia em Tôrres sob as formas de maquetes, os três fatores básicos do saneamento: um recipiente de plástico com a gravação, em destaque, do nome «Remédio»; perfeita miniatura de uma latrina, tipo padrão, pouco generalizada na região e um símile de calçado em recorte de madeira espessa.

Ficou, realmente, com adequada e variada pintura, um conjunto bem proporcionado e sugestivo, com legenda elucidativa na base.

Teve como principal finalidade lembrar, permanentemente, de maneira enfática e objetiva, as principais medidas de erradicação da insidiosa e maléfica endemia.

De tudo só resta o poste. O tempo e a incompreensão humana conspiraram contra os mais benéficos e elevados desígnios em prol da coletividade carente de eficiente e continuada assistência médica e de redentora instrução.

Laboratório instalado no interior

O laboratório, adredemente instalado na cidade de Tôrres, quando transportado aos distritos trabalhados: Morro Azul, Três Cachoeiras e na Colônia São Pedro, despertou extraordinário interesse e grande entusiasmo nos habitantes das respectias localidades.

O total dos exames realizados, sistematicamente pelo processo direto, as mais das vêzes reiterado, simultâneamente empregado com o método de Willis, atingiu 3524 com 2867 positivos e 659 negativos, do que resulta o índice global médio de 81,0%.

Não estão, naturalmente, consignados nas estatísticas anexas, os helmintos que demandam processos especiais de diagnóstico laboratorial.

Medicação coletiva

A moderna terapêutica anti-helmíntica, mais eficaz, bem tolerada e agradável do que a ministrada nos tempos passados, constitui fator coadjuvante e de real estímulo para melhor e completa erradicação das enteroparasitoses.

A medicação de maneira coletiva, realiza-se, habitualmente, nos salões paroquiais das respectivas localidades, em datas prèviamente anunciadas, após a missa dominical.

Em geral não há nenhuma dificuldade quando a educação sanitária prepara psicologicamente o ambiente, como tem ocorrido.

Em desfile ordeiro e compenetrado, as pessoas, sob contrôle médico, tomam os vermífugos na ocasião, de acôrdo com

as fichas individuais constando idade, espécies de helmintos, intensidade parasitária. Depois são anotados: nome do vermífugo, dosagem, data e eventual ocorrência.

No Morro Azul, onde a distribuição de vermífugos foi repetida três vezes, o aspecto da população transfigurou-se sensivelmente, traduzido pelo bem estar geral e maior produtividade do trabalho com evidente reflexo na economia geral da população que espontaneamente se manifesta reconhecida.

Em São Braz a medicação coletiva realizou-se, também, em ótimas condições, por duas vezes. Nos outros distritos o mesmo ocorre na proporção do atendimento, ainda em prosseguimento, com alviçareiras perspectivas.

Foi realmente surpreendente o efeito psicológico da medicação em massa, provocado pela reunião, eventual e benéfica, de pessoas de várias localidades, de caráter médico-social, um contagiante interesse para o tratamento coletivo, oportunidade para intercâmbio de impressões em torno do mal reinante e de outros problemas nosológicos.

Tiveram papel proeminente na eficiência dos trabalhos realizados: o cleiro, representado pelo bondoso e dinâmico Padre Jacó dal Pozzo; o professorado; as autoridades locais e pessoas reconhecidamente prestimosas, do Morro Azul.

Os índices de infestação do Morro Azul constantes das três etapas sucessivas relacionam-se com as medicações efetuadas.

Não traduzem, entretanto, através dos números, a grande diferença operada, quanto ao decréscimo efetivo do parasitismo, porque as pessoas que cooperaram à estatística, umas são as mesmas residentes na sede, enquanto outras moram em lugares diferentes e longínquos e que acorrem pressurosas aos exames e medicações correspondentes conforme as oportunidades.

O estado físico melhorou sensivelmente. Os últimos resultados dos exames coprológicos revelaram menos associações parasitárias e os casos positivos na grande maioria, menor quantidade de elementos parasitários.

Os resultados laboratoriais concordam com a melhoria do estado físico e atividade geral da população.

Medicações e agradecimentos

Talvez pela pouca preocupação da parte burocrática, sobrefujada pelo efetivo atendimento humano, a estatística das medicações representa um total aquém da realidade. Com esta ressalva, seguem-se os dados registrados.

A medicação foi, de modo amplo, sem restrição, generosamente oferecida pelo Laboratório Usafarma, com a constante prestimosidade do gerente Sr. Manoel Iglezias e sub-gerente, Sr. Nilson Gonçalves.

Ao contrário dos anos anteriores, a Prefeitura de Tôrres, tendo à frente o Sr. Manoel João Machado, digno e dinâmico Prefeito, participa, presentemente, da Assistência Médico-Social, e, de modo especial, dos problemas de saneamento.

O trabalho, de exclusiva iniciativa particular e gratuita do autor, sem nenhuma subvenção ou auxílio de qualquer natureza, prossegue com os melhores resultados e representa lídima e espontânea colaboração à coletividade.

Consigno, por motivo de justiça e admiração, uma homenagem ao Exmo. Professor Dr. Francisco Marques Pereira, Secretário da Saúde do Rio Grande do Sul e Diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre da UFRGS., que imprimiu novos e promissores rumos à Medicina Preventiva no grande Estado Gaúcho.

Profilaxia eclética — Tipo padrão de eficiência

Por coincidência verdadeiramente providencial e importante, da comparação ímpar que estabeleci entre as duas regiões opostas — serra e mar — baseado no trinômio médico — sócio — econômico e principalmente nas antíteses que aponte, posso expor dois resultados de aspectos diferentes: um de eficiência imediata, outro de lenta solução profilática.

Não pretendo revolver o problema da profilaxia helmíntica, velho e debatido tema sanitário como não posso omitir os excelentes resultados contidos na presente contribuição.

Serra

Em Canela, sob a influência do ambiente adremente preparado, realizei um tipo de profilaxia piloto, verdadeiramente eclético e de absoluta eficácia, considerando-o modelar e inédito.

A respeito, em trabalho publicado, declarei textualmente: «A erradicação das helmintoses em Canela, município do Rio Grande do Sul, constitui admirável exemplo pela primeira vez executado, da atuação decidida e sincrônica da Secretaria da Saúde, Prefeitura Municipal, «Ascar», Endemias Rurais, Rotary Club, Movimento Comunitário e contribuição espontânea do autor».

Realizando o estudo das condições mesológicas e topográficas como: problema habitacional, alimentar e higiênico; fatores subsidiários: aspecto da população, instrução, mentalidade; atividade rural e vias de comunicações; questões médico-sociais: religiosas, assistência social, exercício da Medicina e doenças endêmicas, coordenei os elementos citados que de maneira sinérgica e entusiástica atuaram nas proporções devidas.

Os fatores básicos do êxito alcançado foram: precisão dos exames helmin-

tológicos, coordenada organização e motivação da educação sanitária por intermédio de conferências e palestras com projeções luminosas no Rotary Club, nas colônias e linhas trabalhadas, nos estabelecimentos de ensino. Pronunciei duas palestras na Rádio local.

Larga difusão de cartazes, coloridos e sugestivos, contendo conselhos higiênicos à profilaxia em prosseguimento, afixados nas casas comerciais e clubes, nas árvores, nas proximidades e caminhos das linhas e colônias, excelente contribuição da «Ascar».

Como condição primordial, dada a ansiedade para obtenção imediata dos remédios, êstes só foram ministrados depois da construção de fossas e instalação dos filtros nas casas sob fiscalização estrita da «Ascar».

Isto se realizou admiravelmente. Em curto lapso de tempo a situação se transfigurou. A fase culminante do trabalho profilático foi de 30 de março a 10 de abril de 1967, depois do que continuou em ritmo uniforme e produtivo para concretização total dos objetivos colimados.

Atualmente uma revisão médico-sanitário se impõe para aferição da verdadeira situação sanitária do meio rural.

QUADRO SINÓPTICO DOS ÍNDICES DE HELMINTOSES DE ALGUMAS LOCALIDADES DE TÓRRES

LOCALIDADES	EXAMES	PERCENTAGEM DOS POSITIVOS
Cantão	Positivos 274	100%
	Negativos 0	
	total 274	
São Braz	Positivos 636	92,00%
	Negativos 56	
	total 692	
Morro Azul 1ª etapa	Positivos 714	86,00%
	Negativos 115	
	total 829	
Morro Azul 2ª etapa	Positivos 281	69,00%
	Negativos 121	
	total 402	
Morro Azul 3ª etapa	Positivos 209	64,00%
	Negativos 120	
	total 329	
Três Cachoeiras	Positivos 395	76,00%
	Negativos 121	
	total 516	
São Pedro	Positivos 249	67,11%
	Negativos 122	
	total 371	

ESTATÍSTICAS LOCAIS ESPECIFICADAS

Morro Azul

<i>A. lumbricoides</i>	364
<i>T. trichiura</i>	57
Ancilostomídeos	111
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	70
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	75
<i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	10
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	19
<i>E. vermicularis</i>	2
<i>A. lumb.</i> + <i>Taenia sp.</i>	4
<i>Ancilost.</i> + <i>Taenia sp.</i>	1
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i> + <i>Taenia sp.</i>	1
Negativos	115
	<hr/>
t o t a l	829

Idades:

1 — 12 meses	5
1 — 10 anos	282
11 — 20 anos	240
21 — 30 anos	129
31 — 40 anos	65
41 — 50 anos	46
51 — 60 anos	37
61 — 70 anos	17
71 — 80 anos	8

t o t a l

829

Morro Azul

5/11/68 — 15/10/68.

<i>A. lumbricoides</i>	81
<i>T. trichiura</i>	27
Ancilostomídeos	75
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	24
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	53
<i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	7
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	9
<i>E. vermicularis</i>	5
Negativos	121
	<hr/>
t o t a l	402

Idades:

1 — 10 anos	157
11 — 20 anos	117
21 — 30 anos	44
31 — 40 anos	33
41 — 50 anos	21
51 — 60 anos	17
61 — 70 anos	9
71 — 80 anos	4

t o t a l

402

Morro Azul

<i>A. lumbricoides</i>	86
<i>T. trichiura</i>	19
Ancilostomídeos	19
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	21
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	42
<i>Ancilost.</i> + <i>T. trich.</i>	10
<i>Ancilost.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>A. lumb.</i>	5
<i>Ti trich.</i> + <i>E. vermic.</i>	2
<i>A. lumb.</i> + <i>E. vermic.</i>	3
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilos.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>E. vermic.</i>	2
Negativos	120
t o t a l	<hr/> 329

Idades:

1 — 10 anos	120
11 — 20 anos	94
21 — 30 anos	25
31 — 40 anos	28
41 — 50 anos	30
51 — 60 anos	20
61 — 70 anos	5
71 — 80 anos	7
t o t a l	<hr/> 329

Observação: Os dados do Morro Azul, de épocas diferentes, referem-se à sede e variados lugares, motivo porque os dados não podem ser comparados quanto aos resultados das medicações.

Três Cachoeiras

<i>A. lumbricoides</i>	133
<i>Ti trichiura</i>	43
Ancilostomídeos	74
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	36
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	69
<i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	16
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	24
Negativos	121
t o t a l	<hr/> 516
1 — 10 anos	164
11 — 20 anos	144
21 — 30 anos	61
31 — 40 anos	76
41 — 50 anos	35
51 — 60 anos	14
61 — 70 anos	17
71 — 80 anos	5
	<hr/> 516

Colônia São Pedro

<i>A. lumbricoides</i>	76
<i>T. trichiura</i>	19
Ancilostomídeos	90
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	4
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	48
<i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	1
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	5
<i>E. vermicularis</i>	3
<i>Taenia sp.</i>	2
Negativos	123
t o t a l	371

Idades:

1 — 10 anos	142
11 — 20 anos	92
21 — 30 anos	40
31 — 40 anos	49
41 — 50 anos	24
51 — 60 anos	13
61 — 70 anos	7
71 — 80 anos	3
81 — 90 anos	1
t o t a l	371

São Braz

<i>A. lumbricoides</i>	123
<i>T. trichiura</i>	38
Ancilostomídeos	137
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	42
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	161
<i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	41
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	94
Negativos	56
t o t a l	692

Idades:

1 — 10 anos	272
11 — 20 anos	206
21 — 30 anos	57
31 — 40 anos	68
41 — 50 anos	59
51 — 60 anos	21
61 — 70 anos	7
71 — 80 anos	2
t o t a l	692

Cantão

<i>A. lumbricoides</i>	42
<i>T. trichiura</i>	41
Ancilostomídeos	14
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i>	76
<i>A. lumb.</i> + <i>Ancilost.</i>	30
<i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	16
<i>A. lumb.</i> + <i>T. trich.</i> + <i>Ancilost.</i>	54
<i>E. vermicularis</i>	1
t o t a l	274

Idades:

1 — 10 anos	115
11 — 20 anos	65
21 — 30 anos	38
31 — 40 anos	20
41 — 50 anos	19
51 — 60 anos	9
61 — 70 anos	8
t o t a l	274

Resumo

A infestação helmíntica, nas proporções ainda observadas em muitas regiões, constitui grave problema sanitário que deveria estar superado e não figurar em qualquer conclave.

O presente trabalho, como aditamento de outros já realizados pelo autor, no mesmo município, inclui os resultados dos exames parasitológicos efetuados gratuitamente nos distritos de Morro Azul, Três Cachoeiras, Colônia de São Pedro, São Brás e Cantão, zona periférica da cidade de Tôres.

Como técnica, foram empregadas, simultaneamente, o exame direto e o método original de Willis, indicados nas circunstâncias de então.

Precedendo os exames, em tôdas as localidades, foram realizadas conferências com projeções de diapositivos alusivos aos helmintos e às helmintoses, palestras na rádio local, nos colégios públicos, na reunião de pais e mestres e clubes, etc. Foram expostos cartazes ilus-

trados no Morro Azul, visando a educação sanitária e uma iniciativa inédita com o mesmo objetivo.

O autor apresenta o fenômeno sócio-parasitário, estuda comparativamente situações mesológicas adversas sob idênticos fatores mesológicos, indica a profilaxia eclética e inclui dados estatísticos relativos aos trabalhos realizados.

A medicação coletiva por cinco vezes repetida, foi realizada, com pleno êxito, em desfile, com datas previamente marcadas.

Os índices de infestação, aqui consignados, traduzem a intensidade do parasitismo helmíntico.

No Morro Azul: 1ª etapa, 829 exames, com 86% de positivos; 2ª etapa, 402 exames com 69% de positivos; 3ª etapa, 329 exames com 64% de positivos.

Três Cachoeiras, 516 exames com 76% de positivos; Colônia São Pedro, 371 exames com 67% de positivos; São Braz, 692 exames com 92% de positivos. Cantão, 274 exames, com 100% de positivos.

di Primio, fot.

Fot. 1 — Salão paroquial, local das palestras e medicação coletiva das helmintoses no Morro Azul.

di Primio, fot.

Fot. 2 — Igreja do Morro Azul. Populares aguardando a palestra sôbre helmintoses.

di Primio, fot.

Fot. 3 — Cartazes referentes à profilaxia das helmintoses com motivações locais.

di Primio, fot.

Fot. 4 — Crianças que desfilaram com os cartazes por ocasião da palestra sôbre helmintoses.

di Primio, fot.

Fot. 5 — Iniciativa inédita do «indicador profilático» em praça pública.

di Primio, fot.

Fot. 6 — Pessoas que compareceram à medicação coletiva em São Braz.