

REVISTA DAS REVISTAS

Goyon e Lemierre mostram a relativa frequência com que perturbações intestinaes pouco intensas pôdem provocar *infecções do rim e das vias urinarias*. E em taes casos a infecção é, via de regra, descendente, mercê de uma bacteriuria discreta.

(25/VII/19 — Sociedade Medica dos Hospitaes de Paris).

Lereboullet e J. Hutinel apresentam duas interessantes observações de *syndrome adiposo genital* de origem hypophisaria, em adultos, em que as perturbações oculares eram notaveis e em que o exame radiographico da sella turcica, feito por Maingot, revelou modificações profundas desta. Um dos doentes apresentava alguns signaes de acromegalia.

Os auctores se referem á possível influencia da syphilis, quer hereditaria, quer adquirida, na determinação de taes dystrophias e mostram a coparticipação frequente da thyroide no syndrome, deduzindo d'ahi conclusões therapeuticas.

(25/VII/19 — S. M. H. Paris)

Marcel Pinard cita um interessante caso de um «syphilitico, albuminurico, hypertenso», com uma *azotemia* de 2,68 que, após reiterado tratamento pelo novarsenobenzol melhorou consideravelmente, tendo a uréa, que se havia elevado em Dezembro de 1917 a 2,83, diminuido progressivamente até 0,60 em Junho de 1919, ao mesmo tempo que baixava a tensão arterial, mantendo-se a albuminuria.

Marcel Labbé estuda a *prova da digestão dos nucleos* no diagnostico da insufficiencia pancreatica, conforme a tecnica de Schmidt, que consiste em envol-

ver n'um saquinho de gaze um pequeno pedaço de carne e procurando-o, depois, nas fezes, notar a duração da travessia gastro-intestinal e, após cortes histologicos, estudar o estado dos nucleos dos tecidos. No estado normal os nucleos são digeridos e não ha, pois coloração: na insufficiencia pancreatica a coloração é facil. Labbé considera essa prova simples e boa, mas acha que é necessario que os outros signaes da insufficiencia pancreatica sirvam de complemento, a uma affirmação cathégorica.

(S. M. H. Paris—25/VII/19)

Loeper propõe, no tratamento do cancer gastrico, as injectões de extracto pancreatico que, segundo elle, agem á maneira de antígeno e augmentam a resistencia do organismo e as suas reacções de defeza em face dos productos cancerosos.

Elle emprega uma solução aquosa de pancreatina a 5 ou 10 %, filtrada em véla e tyndallizada. As injectões são feitas, todos os dias ou de 2 em 2 dias, na dose de 1 a 2 centigrammas.

(S. M. H. Paris—25/VII/19)

Amenille, em cuidadoso estudo, mostra que no começo das nephrites agudas, mesmo em casos graves, as lesões renaes são raras e que só gradualmente ellas se vão installando.

Noel Fiessinger, aconselha o uso das injectões intravenosas de digitalina cristallisada. Para isso junta 5 a 20 gottas da solução normal a 2 c³ de agua estereotizada, podendo, essa dóse de 20 gottas ser renovada, durante 3 dias consecutivos, sem inconveniente.

A. D.