

Estatística do serviço clínico da enfermaria Dr. Wallau, 1.^a clinica cirurgica de homens da Santa Casa de Misericordia durante o anno de 1920, organizada pelo 2.^o adjuncto Dr. Guerra Blessmann.

PESSOAL MEDICO

Director: Dr. Arthur Franco

1.^o adjuncto: Dr. Frederico Falk

2.^o adjuncto: Dr. L. Guerra Blessmann

3.^o adjuncto: Dr. Octacílio Rosa.

Internos: quintannistas de medicina Snrs.: Felicissimo Difini, José Brusque, Mario Corrêa Staedter, Miguel Marques Barreto Vianna e Vicente Modena.

MOVIMENTO DE DOENTES

Estiveram recolhidos á enfermaria, durante o anno de 1920, 412 doentes, tendo sido, pelo director ou seus adjunctos, submittidos a intervenções cirurgicas ou applicações de appparelhos 232; em 126 foram feitos curativos e tratamentos diversos; foram transferidos para outras secções 29, e passaram, para o anno de 1921, 29. Estão englobados no numero dos operados os doentes que foram submittidos a operações de urgência pelo cirurgião interno; estes na estatística operatoria e na de mortalidade, vão marcados com um *.

Alta curados	243
Alta melhorados	47
Alta a pedido.....	46
Alta transferidos	29
Passaram para o anno de 1921.....	29
Alta por fallecimento.....	18
Total.....	412

ESTATISTICA OPERATORIA — 225 OPERAÇÕES

Cabeça, face e pescoço — 17 operações

- | | |
|---|---|
| 1 — Craniotomia e retirada de sequestros por fractura comminutiva do parietal — 1 curado. | tibia em perda de substancia ossea craneana consecutiva á fractura—1 curado. |
| 1 — Craniotomia descompressiva em caso de epilepsia jacksoniana consecutiva a antiga fractura com depressão do parietal — 1 fallecido, (veja estatística de mortalidade, caso n. 15). | 3 — Extirpações de epithelioma do labio inferior, plastica pelo processo dos tres triangulos — 3 curados. |
| 1 — Enxerto osteoperiostico de laminas de | 1 — Extirpação de sarcoma da parotida — 1 curado. |
| | 1 — Extirpação de corpo extranho (pedaço |

de madeira) da região sub-maxillar — 1 curado.

- 1 — Hemiseccão da lingua por epithelioma — 1 curado.
- 2 — Incisões e drenagens em abcesso do couro cabelludo — 2 curados.
- 1 — *Incisão, exploração e drenagem em fractura exposta dos ossos proprios do nariz e do frontal com abertura do seio — 1 curado.

1 — Incisão e drenagem em cysto do antro de Highmore — 1 curado.

- 2 — Incisões e drenagens em abcessos dentarios — 2 curados.
- 1 — Incisão e drenagem em osteoperiostite do maxillar inferior — 1 melhorado.
- 1 — Incisão e drenagem em phleimão do pescoço — 1 curado.

Thorax — 11 operações

- 2 — Extracções de projectis da parede do thorax — 2 curados.
- 1 — Incisão e drenagem em abcesso da parede — 1 curado.
- 1 — Incisão, curetagem e drenagem em osteíte costal — 1 curado.
- 1 — Operação de Schede em empyema pleural chronico — 1 melhorado.

- 1 — Osteosynthese metallica em fractura de clavicula e applicação de aparelho de Dessault — 1 melhorado, indo convalescer em casa; revisto mais tarde foi julgado curado.
- 2 — Suturas de ferimentos incisos da parede thoraxica — 2 curados.
- 3 — Thoracotomias por empyema pleural — 3 curados.

Abdomen, recto e anus — 37 operações

- 6 — Appendicectomias em appendicites chronicas — 6 curados.
- 20 — Curas radicaes de hernias inguinaes — sendo 6 pelo processo de Kocher, 13 pelo processo de Bassini e 1 pelo processo de Bassini-Barker — 20 curados.
- 4 — Curas radicaes de hemorrhoides, sendo 2 pelo processo de Tillaux — 1 melhorado, em convalescença, 1 curado, e 2 pelo processo de Whitehead — 2 curados.
- 3 — Costotomias e drenagens em abcesso de figado — 3 curados.
- 7 — Debridamentos e curetagens em fistulas do anus — 7 curados.
- 1 — Debridamento, cauterisação e drenagem de autrax — 1 curado.
- 2 — Excisões de fistulas estercoraeas, sendo uma acompanhada de resecção do cecum e do appendice, seguida de anastomose ileon-colica termino-terminal — 2 curados.
- 1 — Extirpação de carcinoma da margem do anus — 1 curado.
- 5 — Gastro enteroanastomoses posteriores trans-mesocolicas, processo de Von Hacker, sendo: 1 por ulcera juxtapylorica, seguida de exclusão do pyloro — 1 curado; 3 por estenose pylorica consecutiva a neoplasma maligno — 3 curados; 1

por estenose pylorica determinada por neoplasma maligno da cabeça do pancreas com metastase hepatica — 1 fallecido (veja estatistica de mortalidade n.º 1).

- 1 — Gastrostomia pelo processo de Frank-Witzel em estenose do esophago por tumor maligno — 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n.º 9).
- 2 — Incisões e drenagens em abcessos periappendiculares, appendicite aguda — 2 curados.
- 2 — Incisões e drenagens em abcessos da parede abdominal — 2 curados.
- 1 — Incisão e drenagem em abcesso da fossa ischio-rectal — 1 curado.
- 1 — Incisão e drenagem em abcesso da região lombar — 1 curado.
- 2 — Incisões, curetagens e drenagens em tractos fistulosos consecutivos a ferimentos por bala interessando um corpo vertebral — 2 curados.
- 2 — Kelotomias seguidas de cura radical das hernias pelo processo de Bassini — 2 curados.
- 2 — *Kelotomias seguidas de cura radical das hernias pelo processo de Bassini — 1 curado — 1 fallecido. (Veja estatistica de mortalidade n.º 14).

- 4 — *Laparotomias exploradoras em ferimentos penetrantes de ventre, sendo uma seguida de ressecção intestinal, outra com sutura de ferimentos intestinaes e ligadura de asos mesentericos e outra seguida de sutura, de ferimento hepatico, de ferimento de epiploon e de ferimento não penetrante de estomago e colon transverso — 3 curados e 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n.º 7).
- 1 — Laparotomia exploradora em ferimento penetrante de ventre, interessando o fígado, sutura hepatica, — 1 curado.

- 1 — Laparotomia e drenagem em peritonite suppurada, 1 fallecido (veja estatistica de mortalidade n. 6).
- 1 — Laparotomia exploradora em contusão abdominal, sutura de ferimentos intestinaes — 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n. 16).
- 3 — Laparotomias exploradoras em neoplasmas malignos do ventre — 3 curas operatorias.
- 1 — Ligadura da iliaca externa em hemorrhagia da femural — 1 curado.

Orgãos genito-urinarios — 58 operações

- 1 — Amputação parcial de penis com extirpação de neoplasma maligno — 1 curado.
- 4 — Castrações unilateraes, sendo 2 por neoplasma maligno e 2 por orchoepididymite tuberculosa — 4 curados.
- 5 — Circumcisões, sendo 2 em phimosis congenitas, 2 em phimosis adquirida e 1 em elephantiasis do prepucio — 5 curados.
- 20 — Curas radicaes de hydrocéle, sendo 16 pelo processo de Jaboulay, duas por ressecção da vaginal, 1 pelo processo de Klapp e 1 pelo processo de Marion — 20 curados.
- 3 — Curas radicaes de varicocéle com ligadura e extirpação das varices — 3 curados.
- 2 — Curas radicaes de ectopia testicular, sendo uma pelo processo de Bevan e 1 por libertação e fixação no fundo da bolsa — 2 curados.
- 2 — Debridamentos e curetagens de fistulas urethro-perineae — 2 curados.
- 1 — Excisão e sutura de fistula hypogastrica — 1 curado.
- 1 — Incisão e hemostasia com pinças de demora em hemorrhagia de ferida infe-

- ctada consecutiva a phleimão peri-urethral — 1 curado.
- 1 — Incisão dorsal em parahimosis — 1 curado.
- 4 — Incisões e drenagens em phleimões periurethraes — 2 curados e 2 fallecidos, (veja estatistica de mortalidade ns. 3 e 18).
- 1 — Operação de Hagner em epididymite gonococcica — 1 curado.
- 1 — Prostatectomia transvesical processo de Freyer — 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n.º 5).
- 1 — Resecção de bolsa escrotal seguida de plastica em caso de elephantiasis — 1 curado.
- 2 — Talhas hypogastricas, sendo 1 por calculos vesicaes e 1 por infiltração urinaria — 1 curado, 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n. 11).
- 1 — Urethroplastia em hypospadias, processo de Beck — 1 curado.
- 8 — Urethrotomias internas — 7 curados — 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n.º 11).

Membros — 66 operações

- 1 — Alongamento dos tendões dos flexores, superficial e profundo dos dedos, exigido pela retracção cicatricial em ferimentos antigos — 1 curado.
- 1 — Amputação do pé em fractura comminativa exposta — 1 curado.
- 2 — *Amputações de coxas em um caso de esmagamento de ambas as pernas — 1

- fallecido, (veja estatistica de mortalidade n.º 2).
- 1 — Amputação da perna pelo processo de guilhotina em caso de gangrena humida consecutiva á fractura exposta; regularisação posterior do côto — 1 curado.
- 2 — Amputações do braço pelo processo circular, 1 em caso de queimaduras de 3.º

- grão do cotovello, antebraço e mão e 1 em caso de esmagamento do antebraço com fractura intra-articular exposta da extremidade inferior do humerus — 2 curados.
- 1 — Amputação de perna pelo processo osteoplastica de Bier reclamada por côto doloroso antigo — 1 curado.
- 3 — Apparelhos de Steinmann em fracturas de femur — 3 curados.
- 6 — Desarticulações de dedos da mão por esmagamentos — 5 curados — 1 á pedido, em via de restabelecimento.
- 1 — Desarticulação de dedos do pé por esmagamento — 1 curado.
- 1 — Debridamento e drenagem em tractos fistulosos da região inguinal consecutivos a adenite suppurada — 1 curado.
- 3 — Extirpações de corpos estranhos do pé — 3 curados.
- 1 — Extirpação de projectil da coxa — 1 curado.
- 1 — Extirpação de varices lymphaticas da região inguinal — 1 curado.
- 9 — Incisões, curetagens e drenagens, sendo: 2 em osteite tuberculosa da epiphyse inferior do femur, 1 em osteite tuberculosa dos ossos do pé, 2 em osteite syphilitica do tibia, 2 em osteite do cubitus, 1 em osteomyelite do femur, 1 em osteomyelite do tibia — 7 curados e 2 melhorados.
- 14 — Incisões e drenagens, sendo: 3 em phleimão da mão, 3 em phleimão da coxa, 4 em adenite axillar, 2 em abcessos do pé, 1 em abcesso periarticular do cotovello, 1 em synovite da bolsa retro olecraneana — 14 curados.
- 2 — Incisões, curetagens e drenagens sendo: 1 em tractos fistulosos consecutivos a abcesso da perna e 1 em tractos fistulosos consecutivos a abcesso quente da região glutea, 1 curado — 1 a pedido.
- 1 — Incisão larga e drenagem em fractura infectada comminutiva e exposta do astragalo — 1 fallecido. (Veja estatistica de mortalidade n. 17).
- 2 — Ligaduras da femural em aneurismas da poplitea e esvasiamento do sacco — 2 curados.
- 5 — Osteosyntheses — em fractura do femur 1, em fractura comminutiva do humerus 1, em fractura do radius 1, em consolidação viciosa de fractura do humerus 1, em fractura de cubitus 1 — 5 curados.
- 1 — Resecção de joelho por tuberculose — 1 curado.
- 2 — Reducções de luxações escapulo humeraes pelo processo de Kocher — 2 curados.
- 2 — Sequestrotomias e drenagens em fracturas comminutivas expostas de diversos ossos do pé — 2 curados.
- 1 — *Sequestrotomia em fractura comminutiva da perna, osteosynthese de diversos fragmentos — 1 fallecido.
- 2 — Sutures primarias, 1 em ferimento inciso do pé, 1 em ferimento contuso da perna — 2 curados.
- 1 — *Tenorrhaphia em caso de secção do tendão de Achyles — 1 curado.

Estatística das Anesthesias — 198

<i>Geraes</i>			
		Rachidiana	5
		Paravertebral	1
Chloroformio	146		—
Kelenio	3		21
Chloroformio e ether	2		
Ether	2		
	153		
<i>Regionaes</i>		<i>Locaes</i>	
		Chlorureto de ethyla	13
		Novocaina (por infiltração)	8
		Alypina	3
			—
Novocaina (truncular)	15		24

Estatística dos Apparelhos — 23

- | | |
|--|--|
| <p>6 — Contensivos, sendo 3 em entorse tibio tarsica (2 curados, 1 melhorado), 1 em fractura dos ossos do antebraço (1 curado), e 2 em descollamentos epiphysarios (2 curados).</p> <p>12 — Apparelhos gessados, sendo 10 em fracturas dos ossos da perna (10 curados)</p> | <p>e 2 em fracturas de humerus (2 curados).</p> <p>3 — Apparelhos de Bardenheuer em fractura de femur — 3 curados.</p> <p>1 — Apparelho de Dessault em fractura de clavícula — 1 curado.</p> |
|--|--|

ESTATISTICA DOS CASOS NÃO OPERADOS

Cabeça, face e pescoço — 20 doentes

- | | |
|---|--|
| <p>1 — Aneurisma da carotida primitiva — 1 alta a pedido, inoperavel.</p> <p>1 — Abscessos tuberculosos dos ganglios do pescoço — 1 melhorado.</p> <p>1 — Carbunculo da face — 1 curado.</p> <p>1 — Commoção cerebral — 1 alta a pedido.</p> <p>1 — Contusão da face — 1 curado.</p> <p>1 — Contusão do craneo — 1 curado.</p> <p>1 — Epithelioma do labio e bochecha, metastase para os ganglios do pescoço — 1 alta a pedido, inoperavel.</p> <p>1 — Ferimento contuso da região superciliar — 1 curado.</p> <p>1 — Ferimento inciso do couro cabelludo — 1 melhorado.</p> <p>1 — Ferimento por bala do couro cabelludo — 1 curado.</p> | <p>1 — Ferimento inciso da orelha e região occipital — 1 melhorado.</p> <p>1 — Ferimento por bala da commissura labial — 1 curado.</p> <p>3 — Ferimentos contusos do couro cabelludo — 3 curados.</p> <p>1 — Fractura da base do craneo — 1 curado.</p> <p>1 — Fractura antiga do maxillar inferior e da base do craneo, paralysis do nervo facial direito — 1 melhorado.</p> <p>1 — Neoplasma maligno do nariz — 1 a pedido.</p> <p>1 — Neoplasma maligno do larynge — 1 alta a pedido, inoperavel.</p> <p>1 — Osteoperiostite do maxillar inferior — 1 curado.</p> |
|---|--|

Thorax — 8 doentes

- | | |
|---|--|
| <p>4 — Contusões do thorax — 4 curados.</p> <p>2 — Ferimentos penetrantes da região mammaria — 2 curados.</p> | <p>1 — Ferimento por bala da região clavicular — 1 curado.</p> <p>1 — Ferimento penetrante de faca, hemothorax — 1 curado.</p> |
|---|--|

Abdomen, recto e anus — 21 doentes

- | | |
|---|--|
| <p>1 — Adherencias intestinaes postoperatorias — 1 alta a pedido, não quiz se submeter á intervenção.</p> <p>1 — Colite amebica — 1 alta a pedido, para se tratar em domicilio.</p> <p>1 — Condylomas da margem do anus — 1 alta, a pedido, recusou intervenção.</p> <p>4 — Contusões da região lombar — 4 curados.</p> <p>1 — Ferimento inciso da região mesogastrica e flanco — 1 curado.</p> <p>2 — Ferimentos incisos da região lombar — 1 curado — 1 melhorado.</p> <p>1 — Fistula do anus — 1 alta a pedido, recusou intervenção.</p> | <p>2 — Hemorrhoides — 2 melhorados.</p> <p>3 — Neoplasmas malignos do estomago — 1 a pedido, 1 melhorado, ambos recusaram intervenção e 1 fallecido, (veja estatistica de mortalidade n. 4).</p> <p>1 — Osteo-arthritis sacro-illiac — 1 melhorado.</p> <p>1 — Rectite (syphilitica?) — 1 melhorado.</p> <p>1 — Syphilis gastrica — 1 melhorado.</p> <p>1 — Tumor benigno da bainha do recto — 1 alta a pedido, recusou a intervenção.</p> <p>1 — Ulcera de estomago — 1 alta a pedido, recusou intervenção.</p> |
|---|--|

Apparelho genito-urinário — 33 doentes

- | | |
|---|---|
| <p>3 — Cystites gonococcicas chronicas — 1 melhorado e 2 curados.</p> <p>6 — Estreitamentos de uretra — 1 melhorado, 2 a pedido, 2 curados e 1 fallecido, (veja estatística de mortalidade n. 13).</p> <p>5 — Epididymites gonococcicas — 3 curado, 1 a pedido, 1 melhorado.</p> <p>1 — Ferimento contuso do penis — 1 curado.</p> <p>1 — Ferimento por bala do penis e bolsa escrotal — 1 curado.</p> <p>1 — Fistula uretro-escrotal — 1 alta a pedido, recusou a intervenção.</p> | <p>1 — Neoplasma maligno do penis — 1 alta a pedido — inoperavel.</p> <p>1 — Orchite traumatica — 1 curado.</p> <p>1 — Prostatite chronica gonococcica — 1 melhorado.</p> <p>11 — Retenções de urina por hypertrophia de prostata — 9 melhorados — 2 pedido.</p> <p>1 — Tuberculose renal (?) — 1 a pedido, não terminou os exames precisos para firmar o diagnostico.</p> <p>1 — Ulcera chronica da bolsa escrotal — 1 curado.</p> |
|---|---|

Membros — 45 doentes

- | | |
|---|---|
| <p>2 — Arthrites tuberculosas do joelho — 2 altas a pedido.</p> <p>1 — Atrophia muscular e retracção de tendões consecutiva a fractura antiga mal consolidada dos ossos do antebraço — 1 alta a pedido, para voltar mais tarde.</p> <p>1 — Achylo-dynia traumatica — 1 a pedido.</p> <p>1 — Arthrite gonococcica escapulo-humeral D — 1 curado.</p> <p>2 — Osteites tuberculosas do condylo interno do femur — 1 curado e 1 melhorado.</p> <p>4 — Contusões do pé — 4 curados.</p> <p>1 — Contusão do punho — 1 curado.</p> <p>1 — Contusão do antebraço — 1 curado.</p> <p>1 — Contusão da coxa — 1 curado.</p> <p>2 — Contusões de perna — 1 curado, 1 melhorado.</p> <p>1 — Consolidação viciosa em fractura do V metatarsiano — 1 alta a pedido, para voltar mais tarde.</p> <p>2 — Elephantiasis de perna — 2 altas a pedido.</p> <p>1 — Erythema pernio — 1 curado.</p> | <p>4 — Ferimentos por mordedura de cão — 4 curados.</p> <p>1 — Ferimento inciso do joelho — 1 curado.</p> <p>7 — Ferimentos incisos do pé — 7 curados.</p> <p>1 — Ferimento inciso do braço e da mão — 1 curado.</p> <p>1 — Ferimento inciso da coxa — 1 curado.</p> <p>1 — Ferimento da perna por mordedura de aranha — 1 curado.</p> <p>1 — Ferimento do joelho — 1 curado.</p> <p>1 — Nevrite do circumflexo — 1 curado.</p> <p>1 — Osteite dos metatarsianos — 1 curado.</p> <p>1 — Queimaduras de 3.º gráo de ambas as pernas e coxas — 1 fallecido, (veja estatística de mortalidade n.º 10).</p> <p>1 — Tuberculose ossea dos metatarsianos — 1 alta a pedido.</p> <p>3 — Ulceras varicosas da perna — 1 curado, 2 altas a pedido.</p> <p>1 — Ulcera syphilitica da perna — 1 melhorado.</p> <p>1 — Ulcera chronica do pé — 1 alta a pedido.</p> |
|---|---|

Estatística da mortalidade — 18 doentes

- 1 — 184 — H. V., 44 annos, branco, deste Estado, casado, pedreiro. Entrado a 13 — 1 — 1920, em franca cachexia. Laparotomia exploradora em 14 — 1 — 1920 estabeleceu o diagnostico de neoplasma maligno do pancreas com metastase hepatica. Alta por fallecimento a 22 — 1 — 1920.
- 2 — * 481 — J. O. A., 19 annos, branco, deste Estado, solteiro, chauffeur. Esmagamento completo dos dois membros inferiores. Choque traumatico. Entrou á 1 — 2 — 1920, falleceu á 2 — 2 — 1920.
- 3 — 475 — V. P., 32 annos, branco, deste Estado, solteiro, jornaleiro. Baixou a 7 — 2 — 1920, com infiltração urinaria e septicemia. Apesar de promptas incisões libertadoras e drenagem, falleceu á 12 — 2 — 1920. Continuaram após a intervenção os phenomenos septicemicos.

- 4 — 1054. — A. M., 65 annos, branco, deste Estado, viuvo, jornaleiro. Entrado em 8—3—920. Cancer de estomago. Cachexia. O estado máo do doente não permittiu qualquer intervenção cirurgica. Falleceu em cachexia a 17—3—920.
- 5 — 1258 — E. F. da S., 65 annos, branco, deste Estado, casado, agricultor. Adenoma intra-prostatico. Baixou a 29—3—920. Após os exames indispensaveis foi operado a 31—3—920, sendo feita a prostatectomia transvesical pelo processo de Freyer. Sequencias operatorias boas. Estava já quasi restabelecido, a fistula hypogastrica era de diminuta dimensão, quando á 8—5—1920 foi accommettido de um ataque de angina do peito, fallecendo em poucos minutos.
- 6 — 2004 — R. B. L., 26 annos, deste Estado, preto, solteiro, jornaleiro. Veio transferido da 9.^a secção em 14—5—920 com peritonite generalisada. Laparotomia neste mesmo dia. Verificou-se a existencia da peritonite generalisada, não foi encontrada a causa. A 15—5—920 o doente morreu. A autopsia revelou a existencia de um enorme abcesso do baço, que se rompera para a cavidade peritoneal; de tecido esplenico apenas foi encontrada delgada camada, constituindo as paredes do grande abcesso.
- 7 — * 2203 — D. G. da S., 25 annos, branco, deste Estado, solteiro, praça da Brigada. Ferimento penetrante de ventre por faca ao nivel da cicatriz umbellical. Entrado a 30—5—920. Operado logo após a entrada, verificou-se a existencia de 4 ferimentos de intestino delgado e grande hemorrhagia dos vasos mesentericos. Falleceu em 31—5—920. Causa-mortis: hemorrhagia interna.
- 8 — * 2315 — B. O., 28 annos, mixto, deste Estado, solteiro, cosinheiro. Ferimento contuso extenso da região occipital, fractura comminutiva da perna D, luxação do punho D., varias escoriações. Choque traumatico. Entrado a 7—6—920 — Falleceu a 8—6—920.
- 9 — 2393 — P. R., 50 annos, branco, deste Estado, casado, lavrador. Estenose do esophago por neoplasma maligno que attingia ao cardia. Myocardite e nephrite chronicas. Cachexia. Entrado a 14—6—920, foi-lhe praticada á 16—6—920 um gastrostomia pelo processo de Frank-Witzel. — Alta por fallecimento a 18—6—920, sem complicação postoperatoria.
- 10 — 2463 — D. P., 42 annos, branco, deste Estado, solteiro, jornaleiro. Queimaduras de 2.^o e 3.^o gráo, na perna e coxa direitas, face interna da perna e coxa esquerdas, entrado a 18—6—920, falleceu á 19—7—920.
- 11 — 2808 — J. P. da C., 26 annos, branco, deste Estado, solteiro, foguista. Estreitamento urethral, infiltração urinaria. Entrado a 13—7—920. Urethrotomia interna com o urethrotomo de Maisonneuve em 23—8—920; incisões multiplas e drenagem. A infiltração urinaria augmentou gradativamente, tendo sido feita uma talha hypogastrica a 6—9—920. O doente succumbe em septicemia á 13—9—920.
- 12 — 2846 — F. M., 42 annos, branco, solteiro, deste Estado. Entrado a 16—7—920. Neoplasma maligno abdominal, cachexia. Submettido a laparotomia exploradora em 28—7—920, foi verificada a impossibilidade de qualquer intervenção mesmo palliativa. Grande numero de focos metastaticos hepaticos. Sequencias operatorias boas. O doente morre em cachexia a 7—8—920.
- 13 — 3193 — J. D. da S., 45 annos, côr mixta, deste Estado, casado. Baixou em 10—8—920 por estreitamento de urethra. Ha um anno antes tivera um accidente cerebral que lhe deixou hemiplegico por algum tempo. Péde para ser operado o mais breve possivel, sendo a intervenção marcada para aquella tarde. Ao subir para a meza de operações, antes mesmo que a injeccão urethral anesthesica fosse feita o paciente tem algumas convulsões, perda de conhecimento e morre em poucos minutos. Pareceu-nos tratar-se de uma hemorrhagia cerebral. A autopsia não foi permittida.
- 14 — * 3330 — M. D. da S., 45 anno, côr mixta, deste Estado, solteiro, jornaleiro. Entrado em 20—8—920. Hernia inguinal direita estrangulada, datando de varios dias. Peritonite generalisada. Kelotomia no dia da entrada, drenagem da cavidade peritoneal. Morre em 21—8—920.

- 15 — 3782 — H. S., 44 annos, branco, deste Estado, casado, jornaleiro. Entrado a 20—9—920. Epilepsia jacksoniana consecutiva a antiga fractura com depressão do parietal E e do frontal. Operado a 1—10—920. Anesthesia chloroformica. A intervenção consistiu na craniotomia osteoplastica em uma extensão de 8×10 cm. Encontram-se adherencias de dura-mater ao callo de fractura e ao cerebro. Rompidas estas insere-se entre a dura e o cerebro um retalho de aponevrose do fascia lata. Sutura-se a janella osteo-cutanea. Quatro dias após á intervenção o doente torna-se somnolento, o exame de urina revela glycose e corpos acetonicos. Tratamento por alcalinos per os e endovenoso. Escaras na região sacra e na calcaneana apparecem do VIII dia após a intervenção e o doente morre a 11—10—920 em franca acidose. Autopsia: Campo operatorio em boas condições, tendo em grande parte pegado o enxerto aponevrotico.
- 16 — 3824 — O. O., 41 annos, branco, da Hungria, casado, ferreiro. Entrado a 22—9—920. Contusão abdominal. Operado de urgencia encontraram-se rupturas do intestino e do epiploon, que são suturadas. O doente falleceu em choque a 25—9—920.
- 17 — 4407 — L. M., 35 annos, belga, branco, casado, mechanico. Entrado a 1—11—920, com fractura e luxação expostas do astragalo D., datando de dois dias. Infecção do foco da fractura e estado erysipelatoso da perna D. Septicemia. A' 3—11—920 largo debridamento e drenagem ampla. Endocardite septica. Morte a 10—11—920.
- 18 — 5212 — J. M. F., 29 annos, côr mixta, deste Estado, solteiro, jornaleiro. Entrado a 23—12—1920. Infiltração urinaria. Septicemia. A 24—12—1920, incisões multipas e drenagem, o paciente fallece a 28—12—920.

Compulsando os dados acima expostos, verificamos que, excluindo do movimento total (412 doentes) os que continuam em tratamento em 1921 (29) e os que foram transferidos para outras secções (29), temos de fazer calculos estatisticos em relação á 354 doentes.

Foram submettidos á intervenções cirurgicas ou á applicação deapparelhos 232, isto é, 65,53 % dos doentes tratados na enfermaria.

Tiveram alta, curados — 68,64 % dos doentes tratados, melhorados — 13,27 %, á pedido — 12,99 %, por fallecimento — 5,08 %.

Assim rivalisa a nossa percentagem de mortalidade com a dos melhores serviços mundiaes.

Deduzindo dos casos fallecidos em numero de 18, tres registrados nesta estatistica, sob ns. 4, 10 e 13, que não soffreram intervenção cirurgica, a mortalidade operatoria é de 15 para 225 operações, o que equivale a 6,6 %, proporção tambem muito boa.

E' necessario ponderar que dentro desta percentagem se encontram casos nos quaes as condições dos doentes não permittiam mais ao cirurgião ter outra esperanza, senão a de prolongar a vida por algum tempo, alliviando tanto quanto possivel o paciente.

Dentro deste grupo estão os casos de grandes traumatismos, como os de numeros 2 e 8, e aquelles em que o doente entrou para o serviço, quando os progressos de suas lezões não mais podiam ser atacados, como nos casos ns. 1, 9 e 12.

Deduzindo dos 15 casos estes cinco em que a morte era inevitavel, como o provam as lezões encontradas, ainda mais baixa se torna a nossa percentagem de mortalidade operatoria, que attinge sómente a 4,4 %.

Morreram de neoplasmas malignos quatro doentes, o que significa nos fallecimentos do corrente anno 22,2 % dos obitos totaes.

Este algarismo exaggerado tem explicação no máo estado em que nos são enviados taes doentes. Não tivemos entre todos os casos de neoplasma maligno abdominal um no qual pudessemos tentar intervenção radical. Em muitos a intervenção não passou de exploradora, tendo mesmo havido um, cuja cachexia e inanición não nos permittiram qualquer

tentativa. Melhor seria para estes doentes, si o diagnostico da neoplasia fosse feito, ou pelo menos suspeitado, ainda em inicio, desappareceriam assim muitas gastrites e dyspepsias, como são por muito tempo rotulados os casos que o clinico não leva ao radiologista ou ao cirurgião por não ter palpado o tumor, corpo de delicto muitas vezes no inicio imperceptivel.

E' necessario o exame radiologico para os diagnosticos precoces, nesta occasião, ainda o doente podendo colher resultado com intervenção radical. Quando mesmo assim a duvida persiste, o cirurgião deve intervir, uma laparotomia exploradora armada tem toda a sua indicação; já felizmente muito longe vae, para que se tenha algum receio, a epocha em que taes intervenções eram perigosas.

Em relação ás diversas affecções temos os seguintes dados:

Nas 371 affecções cirurgicas diagnosticadas, 137 eram traumatismos ou affecções a elles directamente ligadas, 23 eram neoplasmas malignos e 211, affecções de outras origens, ou sejam 36,9 % de traumatismos, 6,2 % de neoplasmas malignos e 56,8 % de outras affecções.

Os neoplasmas malignos assim se distribuiam:

Cabeça, face e pescoço 8, sendo: 4 do labio inferior, 1 da parotida, 1 da lingua, 1 do nariz e 1 da larynge.

Abdomen, recto e anus 11, sendo: limitados ao estomago 5, de localisação primaria não precisada, apesar da laparotomia exploradora, devido a adiantada evolução da molestia, attingindo varios orãos 3, da porção terminal do esophago 1, do pancreas 1, do anus 1.

Apparelho genito urinario 4, sendo: 2 do penis e 2 do testiculo.

Dahi resulta que, dos 23 casos de neoplasias malignas, subtrahidos 3 de localisação não precisa, encontram-se 14 ou sejam 70 % pertencendo ao aparelho digestivo e glandulas annexas.

Parece que com os dados expostos já se pôde avaliar da frequencia de tão terrivel e mortifera affecção entre nós. Bem vindo seja pois o dia em que pudermos incluir na nossa estatistica annual, ao lado de casos precocemente operados, casos tratados pelo radium — o que virá attestar mais um progresso da sciencia medica entre nós, ao mesmo tempo que milhares de agradecidos se curvarão perante aquelles que tiverem tido a precisa coragem e força de vontade para arcar com os numerosos obstaculos a uma tal iniciativa, numa terra onde são infelizmente poucos os recursos das instituições de caridade. E' preciso reagir, e necessaria se torna a collaboração de todos, pois esta affecção, que ataca sem distincção alguma, tanto ao rico, como ao remediado, como ao pobre, vae annualmente fazendo desapparecer do Estado um capital que é seu, representado pela somma do esforço productivo de cada um daquelles que é por ella accommettido.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1921.