

ctores etiologicos e a anatomia pathologica e analisa a evolução anatomica nas diversas variedades de fracturas do collo, citando grande numero de trabalhos dos diversos auctores que em diversas epochas tem se occupado do assumpto.

Com detalhe enumera os varios symptomas e signaes que permitem firmar o diagnostico e indica os meios para estabelecer o diagnostico differencial. Depois passa a tratar do prognostico nas diversas fórmulas de fractura.

No seu ultimo capitulo descreve todos os processos de tratamento usados, com maior cuidado, o de Delbet. Para terminar apresenta o A. quatro observações de casos que acompanhou.

ANALYSES

A PROVA DA HEMOCLASIA DIGESTIVA NA INSUFFICIENCIA HEPATHICA — SO' A HEMOCLASIA PODE CHARACTERISAL-A?

O Dr. P. Mauriac no "Journal de Médecine" de Bordeaux n. 3 de 10 de Fevereiro de 1922, depois de se referir á crise hemoclasica, diz, que, naquella mesmo jornal a 10 de Julho de 1921, baseando-se em suas proprias pesquisas e nas de Dorlmcourt, Basm, Saugle etc., havia contestado o valor da prova apresentada por Widal para revelar a insufficiencia hepatica.

Depois de citar as pesquisas de Pinel, Sautenoise, Garrelou, provando a participação intima do systema organo-vegetativo nas reacções da crise vasculo-sanguinea; dizendo ser sufficiente nos vagotonicos a simples emoção para provocar a crise hemoclasica, põe em evidencia a incerteza do methodo de Widal para revelar a insufficiencia hepatica. Acha-se o autor inclinado contra essa tendencia em julgar a hemoclasia só pela lencopenia sobrevinda nas condições da experiencia proposta por Widal.

Após considerações sobre as observações de M. Cabanat relativamente ás variações lencocytarias no homem normal, ao artigo de Galup sobre asthma e hemoclasia e varios outros trabalhos, depois de se referir á questão da oscillação das cifras, amparado em suas considerações um tanto razoaveis, termina fechando-se nas seguintes palavras de Hayem:

"As fluctuações dos globulos brancos são relativamente muito mais consideraveis que as dos globulos vermelhos. Neste particular ha a levar em conta, não sómente differenças individuaes, mas ainda variantes bastante fortes que podem se verificar no mesmo individuo, segundo circumstancias multiplas, que não são sempre de facil determinação ... E' evidente então que, para darmos um valor rigoroso ás fluctuações desses elementos em casos pathologicos, é preciso que, o numero das observações seja bastante elevado, que a modificação numerica attribuida ao estado morbido seja nitida, isto é, "sufficientemente accentuada e sempre no mesmo sentido". Nós que estamos empenhados em pesquisas attinentes ao mesmo assumpto possivelmente apresentaremos nestas columnas aquillo que a observação e a experimentação tiverem evidenciado.

Dr. Argymiro Galvão.

REVISTA DAS REVISTAS

O uso da paraffina no tratamento da constipação chronica Dr. W. Zweig (Mediz. Klinik n. 5, 1922)

O auctor chama a attenção sobre a efficacia do regime puramente dietetico para o combate da prisão de ventre; porém, em vista das constantes difficuldades economicas e sociaes do seu paiz, Zweig, recorre á paraffina liquida, que, exercendo, uma simples acção mecanica, lubrificadora, produz um excellente esvasiamento intestinal.

Na Inglaterra o mesmo producto é usado sob o nome de **Arbuthnot Lane**.

E' preciso notar que o paraffina não é um laxante, mas, um lubrificante da mucosa intestinal, de acção puramente mecanica.

Recommenda o seu uso principalmente nas constipações atonicas, typo colico ascendente com as respectivas estases, nas colites chronicas em seus periodos espasmódicos.

São contra indicações, as constipações rebeldes e antigas já tratadas por longo tempo com laxantes; os casos com que se exige uma purgação rapida.

Weber.

Sobre o tratamento do aborto infectado, Dr. H. Kritzler (Mediz. Klinik. n. 5, 1922)

Baseado em 6872 casos, Kritzler observou em 1972 casos temperatura acima de 38°, destes curetou 1595 e em 377 absteve-se desta intervenção, já por complicações annexaes, parametrite e peritonite, já por não ter sido necessario. O esvasiamento instrumental em aborto infectado forneceu 3 % de mortalidade, quando a percentagem total foi de 8,47.

Immediato desaparecimento da febre em 60 % dos casos, demonstra a oportunidade desta intervenção.

Em dois casos houve perfuração do utero, aliás, curados após a hysterectomia.

Nunca emprega lavagens endo-uterinas, bem como tamponamento uterino ou vaginal.

Weber.

A constante ureo-secretores de Ambard, Alfredo Lublin (Biochemi Zeits, vol. 125)

Após um bem fundamentado estudo analytico das 3 leis de Ambard, o auctor conclue que a constante Ambard não pôde ser utilizada como prova funcional dos rins.

Weber.

Diretriz cirurgica na oclusão intestinal, K. Brennan (Long Island Med-Journ. Dez. 1921)

Todos os casos suspeitos de oclusão intestinal devem ser vigiados cuidadosamente até a confirmação do diagnostico; o prognostico e evoluir sombrio desta molestia serão diminuidos pelo reconhecimento e diagnostico precoce, permitindo "ipso-facto", intervenções oportunistas que, assim, serão praticadas em terreno mais favoravel.

Brennan recommenda com ardor a limitação da intervenção á uma simples enterostomia; esta remove urgentemente o symptoma gravissimo do toxemia.

Os prognosticos sombrios, são ainda diminuidos pela operação rapida.