

ctores etiologicos e a anatomia pathologica e analisa a evolução anatomica nas diversas variedades de fracturas do collo, citando grande numero de trabalhos dos diversos auctores que em diversas epochas tem se occupado do assumpto.

Com detalhe enumera os varios symptomas e signaes que permitem firmar o diagnostico e indica os meios para estabelecer o diagnostico differencial. Depois passa a tratar do prognostico nas diversas fórmas de fractura.

No seu ultimo capitulo descreve todos os processos de tratamento usados, com maior cuidado, o de Delbet. Para terminar apresenta o A. quatro observações de casos que acompanhou.

ANALYSES

A PROVA DA HEMOCLASIA DIGESTIVA NA INSUFFICIENCIA HEPATHICA — SO' A HEMOCLASIA PODE CHARACTERISAL-A?

O Dr. P. Mauriac no "Journal de Médecine" de Bordeaux n. 3 de 10 de Fevereiro de 1922, depois de se referir á crise hemoclasica, diz, que, naquella mesmo jornal a 10 de Julho de 1921, baseando-se em suas proprias pesquisas e nas de Dorlmcourt, Basm, Saugle etc., havia contestado o valor da prova apresentada por Widal para revelar a insufficiencia hepatica.

Depois de citar as pesquisas de Pinel, Sautenoise, Garrelou, provando a participação intima do systema organo-vegetativo nas reacções da crise vasculo-sanguinea; dizendo ser sufficiente nos vagotonicos a simples emoção para provocar a crise hemoclasica, põe em evidencia a incerteza do methodo de Widal para revelar a insufficiencia hepatica. Acha-se o autor inclinado contra essa tendencia em julgar a hemoclasia só pela lencopenia sobrevinda nas condições da experiencia proposta por Widal.

Após considerações sobre as observações de M. Cabanat relativamente ás variações lencocytarias no homem normal, ao artigo de Galup sobre asthma e hemoclasia e varios outros trabalhos, depois de se referir á questão da oscillação das cifras, amparado em suas considerações um tanto razoaveis, termina fechando-se nas seguintes palavras de Hayem:

"As fluctuações dos globulos brancos são relativamente muito mais consideraveis que as dos globulos vermelhos. Neste particular ha a levar em conta, não sómente differenças individuaes, mas ainda variantes bastante fortes que podem se verificar no mesmo individuo, segundo circumstancias multiplas, que não são sempre de facil determinação ... E' evidente então que, para darmos um valor rigoroso ás fluctuações desses elementos em casos pathologicos, é preciso que, o numero das observações seja bastante elevado, que a modificação numerica attribuida ao estado morbido seja nitida, isto é, "sufficientemente accentuada e sempre no mesmo sentido". Nós que estamos empenhados em pesquisas attinentes ao mesmo assumpto possivelmente apresentaremos nestas columnas aquillo que a observação e a experimentação tiverem evidenciado.

Dr. Argymiro Galvão.

REVISTA DAS REVISTAS

O uso da paraffina no tratamento da constipação chronica Dr. W. Zweig (Mediz. Klinik n. 5, 1922)

O auctor chama a attenção sobre a efficacia do regime puramente dietetico para o combate da prisão de ventre; porém, em vista das constantes difficuldades economicas e sociaes do seu paiz, Zweig, recorre á paraffina liquida, que, exercendo, uma simples acção mecanica, lubrificadora, produz um excellente esvasiamento intestinal.

Na Inglaterra o mesmo producto é usado sob o nome de **Arbuthnot Lane**.

E' preciso notar que o paraffina não é um laxante, mas, um lubrificante da mucosa intestinal, de acção puramente mecanica.

Recommenda o seu uso principalmente nas constipações atonicas, typo colico ascendente com as respectivas estases, nas colites chronicas em seus periodos espasmódicos.

São contra indicações, as constipações rebeldes e antigas já tratadas por longo tempo com laxantes; os casos com que se exige uma purgação rapida.

Weber.

Sobre o tratamento do aborto infectado, Dr. H. Kritzler (Mediz. Klinik. n. 5, 1922)

Baseado em 6872 casos, Kritzler observou em 1972 casos temperatura acima de 38°, destes curetou 1595 e em 377 absteve-se desta intervenção, já por complicações annexaes, parametrite e peritonite, já por não ter sido necessario. O esvasiamento instrumental em aborto infectado forneceu 3 % de mortalidade, quando a percentagem total foi de 8,47.

Immediato desaparecimento da febre em 60 % dos casos, demonstra a oportunidade desta intervenção.

Em dois casos houve perfuração do utero, aliás, curados após a hysterectomia.

Nunca emprega lavagens endo-uterinas, bem como tamponamento uterino ou vaginal.

Weber.

A constante ureo-secretores de Ambard, Alfredo Lublin (Biochemi Zeits, vol. 125)

Após um bem fundamentado estudo analytico das 3 leis de Ambard, o autor conclue que a constante Ambard não pôde ser utilizada como prova funcional dos rins.

Weber.

Diretriz cirurgica na oclusão intestinal, K. Brennan (Long Island Med-Journ. Dez. 1921)

Todos os casos suspeitos de oclusão intestinal devem ser vigiados cuidadosamente até a confirmação do diagnostico; o prognostico e evoluir sombrio desta molestia serão diminuidos pelo reconhecimento e diagnostico precoce, permitindo "ipso-facto", intervenções oportunistas que, assim, serão praticadas em terreno mais favoravel.

Brennan recommenda com ardor a limitação da intervenção á uma simples enterostomia; esta remove urgentemente o symptoma gravissimo do toxemia.

Os prognosticos sombrios, são ainda diminuidos pela operação rapida.

E' ainda importante factor, no tratamento do ileus, a escolha e administração do anesthesico de accordo com a tolerancia individual dos pacientes.

Weber.

Tres casos de prurido vulvar curados pela autoseroterapia, Dr. J. Montes (Clínica Castellana, Dezembro 1921)

Quando, durante a gestação apparece um prurido vulvar intoleravel, e, não existindo nenhuma lezão cutanea que a explique, Recasens admite uma origem interna. Com effeito, opina este autor pela acção das toxinas de origem ovular ou materna, insufficientemente modificadas pelo fígado,, pelas parathyroides ou outros systemas vasculares sanguineos encarregados desta funcção. Estas toxinas teriam uma acção sobre os centros nervosos, e determinam este singular prurido.

Montez, baseado em trabalhos de Hilario recorreu á autoseroterapia em tres gestantes do terceiro ao quinto mez de gravidez, apresentando intoleravel prurido vulvar.

Extrae o sangue com seringa de 10 á 20 c.c. por phlebotomia; este sangue, conservado num frasco esterilizado, coagulando e sedimentando expontaneamente, produz no fim de 8 á 21 horas, o soro destinado a reinjecção, por via hypodermica.

As injecções são intervalladas de 7 a 15 dias, sendo que, a 1.ª de 5 á 7 c.c.; a 2.ª de 10 á 15 c.c.

Montes, conseguiu curar completamente as suas gestantes.

Weber.

Levaditi — Novo tratamento da syphilis. — Pathologia geral — Janeiro de 1922.

Sauton e Robert demonstraram a efficacia dos saes de bismuth no tratamento da espirillose das gallinhas e em certas trypanosomias, estudos estes que deram inicio aos trabalhos do auctor em relação ao tratamento da syphilis experimental do coelho e mais tarde ao da syphilis humana.

Os animaes foram inoculados, uns com um virus dermatropo, proveniente de um caso de syphilis primaria humana, tendo soffrido passagens successivas sobre o coelho, outros com um virus de paralytico geral, entretido desde dois annos sobre a mesma especie animal, e todos tratados pelo tartaro-bismuthato de potassio e de sodio quando suas lesões estavam em plena evolução.

O resultado obtido tendo sido excellente Levaditi julgou-se auctorizado a ensaiar esta therapeutica no homem.

Ahi recorreu aos saes insolúveis de bismutho em suspensão oleosa pois os saes solubilizados foram julgados inapplicaveis pelas dores e tumefacção que provocavam na séde da injecção.

Verificou o auctor pelos casos que observou que o tartaro-bismuthato de potassio e sodio determina o desapparecimento rapido dos treponemas das lesões abertas bem como a cicatrização dellas em poucos dias.

Actúa tambem sobre a adenopathia syphilitica primaria e influencia favoravelmente os casos de accidentes terciarios.

A reacção de Bordet e Gengou (Wassermann) em dois casos de syphilis tratada e que era positiva, tornou-se negativa e ainda assim se mantem.

Como accidentes foram unicamente observados a coloração azul do rebordo gengival e a estomatite, as quaes servem para traduzir a impregnação do organismo pelo bismutho. Até esta data nenhum dos doentes tratados desde Maio de 1921 apresenta nem recidiva, nem nada que possa indicar uma acção toxica tardia do producto.

Fournier e Guenot, Marie e Fourcade, e Bernard, de Bruxellas, publicaram até o presente varios casos de syphilis em diversos periodos, assignalando todos o bom resultado therapeutico dos saes de bismutho. Na paralyisia geral alguns não observaram effeito apreciavel, mas verificaram a sua efficacia em casos de gomas do cerebro e de paraplegias de origem syphilitica.

Conclde o auctor, affirmando que o tartaro bismuthato de potassio e sodio é um espirillicida activo, de acção rapida e profunda; si elle poderá curar definitivamente a syphilis, só o futuro póde responder a esta pergunta, porém nós temos inteira confiança.

G. B.

Eusterman e Senty — Tumores benignos do estomago (Surgery. Gynec. and Obstr. Janeiro de 1922)

Os casos de tumores benignos verificados pela operação representam 1,3 por cento de todos os tumores gastricos operados. Eram em numero de 27 sendo 12 homens e 15 mulheres. As idades variaram desde 8 annos, um rapaz com um cysto dermoide da parede posterior do estomago pesando 1000 grammas, até 67 annos, um homem com hemangioma da parede anterior e corpo do estomago.

O maior numero foi encontrado na segunda e sexta decadas da vida, sete em cada uma. Metade de todos os pacientes eram de mais de quarenta annos. Em 13 casos os tumores eram visinhos do pyloro, em cinco occupavam a parede posterior, em cinco a parede anterior e dois se distribuam largamente em grande parte do órgão.

Em um caso ainda o esophago e o jejuno estavam atacados e em um outro as observações não affirmam a séde precisa. A maioria dos tumores era sessil. A analyse do succo gastrico e a symptomatologia pouco auxilio trouxeram para o diagnostico. Praticamente póde se considerar que todos os tumores pequenos não apresentavam symptomas. Sete pacientes tinham tumores palpaveis, trez dos quaes eram fibromyomas, trez fibromas, um dermoide e um leiomyoma. Dez pacientes tiveram hemorragias repetidas, com anemia a fraquesa. Isto era principalmente devido a ulceração ou erosão de uma porção do tumor. Trez dos quatro pacientes com angioma tem tido hemorragias graves e anemia.

Sete pacientes tiveram obstrução. Um destes era um paciente com um fibromyoma da parede posterior o qual determinou uma intusseção desta parede no duodeno. Graves ataques dolorosos, simulando colica biliar, foram notados em diversos casos de tumores justa-pyloricos que como uma valvula determinavam obstrucção passageira. Tumores myomatosos do pyloro, com ou sem obstrução pylorica, simulavam a syndrome da ulcera duodenal. A apparencia radiographica dos grandes tumores não poude ser distinguida da do cancer gastrico. Muitos pacientes com tumores gastricos benignos não conseguiram antes ser operados porque seus tumores foram considerados como malignos e inoperaveis. A verdadeira natureza de lezão só foi descoberta quando os pacientes insistiam pela operação. Os resultados das intervenções cirurgicas, foram excellentes.

G. B.