Revista das Revistas

Um novo remedio contra a sarna

A sarna ou escabiose é uma affecção parasitaria muito commum, mesmo entre pessoas de tratamento, e nem sempre é facil estabelecer o diagnostico, sobretudo no inicio, dada a difficuldade de determinar a sua origem sarcoptica. Muito embora cuidadoso exame clinico, minuciosa pesquiza dos sulcos caracteristicos e verificação dos pontos de predilecção do mal, em muitos casos só o exame microscopico poderá dar certeza da causa parasitaria em questão. Como se sabe, são frequentes os casos de "pseudo-escabiose" simulando a verdadeira sarna, a qual não é raro apresentar-se, com a ausencia dos sulcos acima referidos.

Estabelecido o diagnostico, convem iniciar, desde logo, o tratamento, que até bem pouco era bastante penoso. Consistia em previas fricções seccas com escova, para abrir mechanicamente os sulcos intra-epidermicos ou em fricções com sabão negro, seguida da applicação da pomada de Helmerich que o doente conservava durante a noite.

Esse tratamento, como é sabido, tem diversos inconvenientes; além de sujar ou mesmo estragar a roupa, incommoda o doente e irrita-lhe a pelle. O mesmo se dá com a pomada de Helmerich-Hardy ou com os preparados em que entram o balsamo do Perú, o naphtol, o alcatrão, que podem, ás vezes, provocar lesões renaes.

As preparações de enxofre soluvel apresentam enormes vantagens. Ha uma formula, a de Ehlers, de facil applicação, mas com a desvantagem de ser excessivamente gordurosa. E' uma mistura em que entra a vaselina, a lanolina, o polysulfureto de potassio, o oxido de zinco e a vaselina liquida.

A todas as preparações existentes, sobrepuja o novo preparado sulfuroso denominado Mitigal Bayer.

Esse medicamento não exige fricções previas com sabão negro; basta pincelar o corpo com o Mitigal (que é quasi inodoro, que não suja, não estraga e não irrita a pelle), e friccional-o em seguida, ligeiramente. Essa applicação será feita tres vezes cada 12 ou 24 horas, o que é bastante commodo, á qual se segue um banho com sabão commum, mudando-se a roupa branca.

Uma hora depois da primeira applicação o prurido abranda-se e, no fim do tratamento, (outra vantagem do Mitigal), desapparecem, sem deixar vestigios, as efflorecencias e as pyodermites communs á sarna.

K.

A Educação de Anormaes na Republica Argentina — P. Sr. Arturo Ameghino (La Clinica Psicopedagogica n.° 1-2, Anno I, Agosto-Setembro 1923).

De suabella resenha critica o auctor, resume dizendo.

As instituições affectadas á educação de anormaes, se reduzem, em todo o paiz, a estes quatro: escola del Azilo Colonia Regional Mixto de Torres, nacional; Instituto Psicopedagogico de Buenos Ayres, privado; Clinica psicologica de Rosario, nacional; Instituto de Ensenanza Especial, com escola anexa, provincial.

Pensamos, que muito mais se deve fazer, enormemente mais, e que é necessario proceder segundo um plano premeditado, em cuja formação intervenham todos os ensinamentos dos grandes mestres d'esta sciencia.

Pensamos, tambem, que este plano deverá conter esta principios já definitivamente conquistados; que em ultima analyse, os anormaes se dividem, segundo o ponto de vista pedagogico em perigosos ou ineducaveis, educaveis, e educaveis escalarisaveis, que a intervenção do medico psiquiatra é indispensavel, pois que são suas aptidões, as que encerram o segredo do exito; que é inprescindivel, em todos os casos, o laboratorio de psicologia experimental.

Pensamos, finalmente, que esse plano, trará algum dia o augmento dos asilos-colonias e a intensificação do ensino agricola; a creação de escolas autonomas ou auxiliares; a estimulo da creação de institutos medico-pedagogicos privados; e a installação de numerosas classes differenciaes nas escolas communs.

Weber

Sobre um novo detalhe de Technica operatoria da hysterectomia abdominal — Dr. C. D'ardano, La Juventud Medica (Gutemala), Julho 1923.

Após um acurado estudo das technicas habituaes da hysterectomia, quer total, quer sub-total, Iardans apresenta um novo detalhe n'estas intervenções gynecologicas. Visando evitar os prolapsos prat-operatorios tão frequentes, pratica resumidamente da seguinte maneira.

Executa uma variante de traquelopexia ou colpopexia. Qualquer que seja o processo de hysterectomia abdominal á empregar, começa por seccionar os ligamentos redondos ao nivel da sua inserção uterina. A seguir faz-se uma incisão ao longo de cada ligamento redondo, comprehendendo unicamente a camada peritoneal que o cobre, extendendo-se mais ou menos até a metade do seu trajecto intra pelvico.

Os ligamentos são assim libertos das suas adherencias aliás bem frouxas e pinça-se suas extremidades. Feito isto, pratica-se a hysterectomia, formando-se, por ultimo a aza, fixando-a ao collo, ou á vagina.

A peritonisação é executada da maneira habitual.

Weber

Pesquizas sobre o Liquido Cephalo-Rachidiano nos disturbios da Nutrição. — La Pediatr. 15-11-23, n.° 22.

Conclue o auctor do seu estudo:

1.° — A taxa de assucar no liquido cephalo-rachiano das creanças, com disturbios da nutrição oscilla entre um minimo de 0,28700 e um maximo de 1,115700.

2.° — Os algarismos mais baixos correspondem aos estados de atrophia, ao passo que os mais altos aos estados de intoxicação.

3.° — Na dyspepsia sub-aguda e na distrophia a taxa da glycose no liquor está comprehendido, entre os valores medios, achados nas creançças sãs.

Estas cifras variaveis da glycorhaphia deve, em tudo, manter-se paralella ás variações do assucar no sangue, observadas por outros auctores nos lactantes com disturbios da nutrição.

Weber

Observações sobre 175 casos de Pyelonephrite — Dr. C. Stirling; Surg. Gyn. Obst. Dezembro 1923, n.° 6.

Um cuidadoso exame do tracto urinario deve ser feito antes de se abrir um abdomen.

N'estas series de casos 29% foram operados por via abdominal sem allivio completo para os pacientes.

A pyelonephrite é frequentemente ignorada pelos medicos e emquanto isto se diz, continuaremos a deixar de curar grande numero de casos.

Poderá se fazer o diagnostico habitualmente, pelo exame d'uma urina de 24 horas e, si necessario fôr, por uma syntoscopia, catheterismo ureteral, e havendo duvida, um pyelographia.

O tratamento n'um consiste nos methodos conservadores, mas na eliminação dos fócos da infecção, lavagem do bassinete e dilatação do weter com a correcção de possiveis defeitos mecanicos.

Weber

Sobre Miliar — (Mut. "Revista Americana de Sciencias Medica" — Junho de 1923).

A proposito de um caso, mostra a vantagem de lembrar as principaes considerações desta molestia; moça de 24 annos sem antecedentes lignos; depois de ter tomado um purgante sente um mal estar, oppressão e prurido cutaneo.

Considera-a como intoxicação medicamentosa; prescreve-se calomelanos, dieta e lavagens; no dia seguinte tem [illegible], muita excitação com angustia precordial, palpitações, insomnia, suores pouco abundantes e olygureo. Os symptomas accentuam-se, febre alta; assim permanece até ao quarto dia até que apparecem vesiculas pequenas tamanho de uma cabeça de alfinete no peito e nas extremidades superiores; continua a febre alta, picadas pelo corpo, sensação dolorosa onde se manifestou o exanthema vesicular. O diagnostico inclina-se para suor miliar. Dias depois as vesiculas chrystallinas foram opacificando-se, secearam, attenuando-se pouco a pouco o exanthema. A vesiculação foi invadindo a espadua, ventre e extremidades inferiores e segundo o typo dos primeiros signaes citados dando-se a descamação furfuracea.

A medida que as vesiculas iam seccando, o estado geral melhorava desapparecendo a febre. O tratamento foi lieta factea, bebidas abundantes e alguns tonicos.

Factores da Deligencia — (Ramon Beltram — "Rev. Criminologia, Psycheatria e Medicina Legal" — Janeiro e Fevereiro de 1922).

O auctor resume a estatistica da Penitenciaria Nacional de Buenos Ayres correspondente ao anno de 1921 e faz algumas considerações que contribuem para esclarecer o problema da deliquencia na Argentina.

O mais caracteristico é o delicto contra a propriedade, o maior numero; a maioria dos deliquentes são homens de 21 a 40 annos; influem nesta proporção a sexualidade e ambição manifestada entre os 21 e os 40 annos; como corroboração do facto a assignalar que ha poucos casados, sua situação contrabalança o influxo de ambas as paixões; a ignorancia e a falta de educação apparecem como factor preponderante; o jogo em suas diversas formas por sua vez contribue para augmentar o numero; o *cabaret* com os seus derivados de prostituição e a facilidade para adquirir drogas perigosas, como a cocaina e o opio que são factores de primeira ordem; necessita-se para lutar contra estes elementos a intervenção do Estado; para isto impõe-se uma obra educadora e de instrucção de grande alcance, legislada e actuada segundo as necessidades do ambiente e completada com a perseguição tenaz dos vendedores de taes drogas; deve-se prohibir certo genero de diversões a pessoas menores de 28 annos; deve-se fiscalisar a prostituição em geral, em particular destes locaes; vigiar o consumo do alcool e for fim fomentar como medida complementar contra a deliquencia a creação de numerosos campos de desportos, particularmente com indicação para as crianças.

Notas de therapeutica

O *Stovarsol* cura rapidamente a dysenteria amebica; é o que affirma, com toda a sua autoridade, o professor Marchoux, do Instituto de Pasteur de Paris.

O *Stovarsol* é um arsenical, o "composto 190" do Laboratorio Poulenc Fréres e se administra em comprimidos.

Marchoux diz que a constancia dos successos therapeuticos o leva a publicar desde já a sua impressão.

(Biologie Médicale. 1923 p. 178).

Tratamento da syphilis do lactante
(M. Pinard — Bulletin Médical — 1923 — n.° 7.)

Constará de injecções de 914, endovenosas ou subcutaneas. As endovenosas na jugular interna, nas veias epicraneanas ou no seio longitudinal superior.

As dóses serão, para um recemnascido, de 0,005 mil., 1 cgr.; 1 cgr. 5; 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ctgr.; sendo as injecções feitas com intervallos de 3 a 4 dias.

21 dias depois, far-se-á a segunda série com doses mais fortes; o tratamento será continuado em séries successivas com 21 dias de repouso, até desapparecerem os signaes clinicos e serologicos.

Um lactante heredosyphilitico deverá ser assim tratado, por series successivas, durante um a 2 annos, ás vezes mais.

O tratamento pelo bismutto, no lactante, está ainda em ensaio.

O mercurio, acha M. Pinard, deve ser o medicamento de excepção e se prestou grandes serviços, permittiu, no emtanto, que o mundo ficasse cheio de dystrophicos, asthenicos e tarados mentaes. E' porque a luta contra a syphilis hereditaria deve ser conduzida com precisão por tratamentos tão intensos quanto methodicos e bem regrados, que se fará mais, por este tiro indirecto, para a diminuição da tuberculose e do cancer, do que por todos s meios actualmente empregados.

A. D.

O auctor chama a attenção para o *syndrome epigastrico*, que sobreviria nas primeiras seis horas do ataque e precederia, assim, os signaes classicos da fossa iliaca direita.

O doente queixa-se de uma dôr forte epigastrica e vomita frequentemente, permanece em decubito dorsal.

Ha uma sensibilidade especial, localisada na região epigastrica esquerda superior, com espasmo muscular do gran reabsorpção ao seu nivel de productos extremamente toxicos. motores na região epigastrica, precisamente como se tratas mado provoca um reflexo hypotensor, que vae pelo plexo solar, e que é de natureza vagotonica.

Parece que o syndrome epigastrico dependa de uma excitação hyper-aguda do pneumogastrico.

E' um syndrome precoce e passageiro e, por isso, quasi nunca observado em hospital, onde os doentes já chegam com os phenomenos iliacos.

A. D.