

A pyelonephrite é frequentemente ignorada pelos médicos e enquanto isto se diz, continuaremos a deixar de curar grande numero de casos.

Poderá se fazer o diagnostico habitualmente, pelo exame d'uma urina de 24 horas e, si necessario fôr, por uma syntoscopia, catheterismo ureteral, e havendo duvida, um pyelographia.

O tratamento n'um consiste nos methodos conservadores, mas na eliminação dos focos da infecção, lavagem do bassinete e dilatação do weter com a correcção de possiveis defeitos mecanicos.

Weber

Febre Miliar — (Mut. "Revista Americana de Sciencias Medica" — Junho de 1923).

A proposito de um caso, mostra a vantagem de lembrar as principais considerações desta molestia; moça de 24 annos sem antecedentes lignos; depois de ter tomado um purgante sente um mal estar, oppressão e prurido cutaneo.

Considera-se como intoxicação medicamentosa; prescreve-se calomelanos, dieta e lavagens; no dia seguinte tem febre alta, muita excitação com angustia precordial, palpitações, insomnia, suores pouco abundantes e olygureo. Os symptomas accentuam-se, febre alta; assim permanece até ao quarto dia até que apparecem vesiculas pequenas tamanho de uma cabeça de alfinete no peito e nas extremidades superiores; continua a febre alta, picadas pelo corpo, sensação dolorosa onde se manifestou o exanthema vesicular. O diagnostico inclina-se para suor miliar. Dias depois as vesiculas chrySTALLINAS foram opacificando-se, secearam, attenuando-se pouco a pouco o exanthema. A vesiculação foi invadindo a espadua, ventre e extremidades inferiores e segundo o typo dos primeiros signaes citados dando-se a des-camação furfuracea.

A medida que as vesiculas iam seccando, o estado geral melhorava desaparecendo a febre. O tratamento foi lieta lactea, bebibas abundantes e alguns tonicos.

Factores da Deligencia — (Ramon Beltram — "Rev. Griminalologia, Psychiatria e Medicina Legal" — Janeiro e Fevereiro de 1922).

O autor resume a estatistica da Penitenciaria Nacional de Buenos Ayres correspondente ao anno de 1921 e faz algumas considerações que contribuem para esclarecer o problema da deliquencia na Argentina.

O mais caracteristico é o delicto contra a propriedade, o maior numero; a maioria dos deliquentes são homens de 21 a 40 annos; influem nesta proporção a sexualidade e ambição manifestada entre os 21 e os 40 annos; como corroboração do facto a assignalar que ha poucos casados, sua situação contrabalança o influxo de ambas as paixões; a ignorancia e a falta de educação apparecem como factor preponderante; o jogo em suas diversas formas por sua vez contribue para augmentar o numero; o *cabaret* com os seus derivados de prostituição e a facilidade para adquirir drogas perigosas, como a cocaína e o opio que são factores de primeira ordem; necessita-se para lutar contra estes elementos a intervenção do Estado; para isto impõe-se uma obra educadora e de instrução de grande alcance, legislada e actuada segundo as necessidades do ambiente e completa da com a perseguição tenaz dos vendedores de taes drogas; deve-se prohibir certo genero de diversões a pessoas meno-

res de 28 annos; deve-se fiscalisar a prostituição em geral, em particular destes locaes; vigiar o consumo do alcool e for fim fomentar como medida complementar contra a deliquencia a creação de numerosos campos de desportos, particularmente com indicação para as crianças.

Notas de therapeutica

O *Stovarsol* cura rapidamente a dysenteria amebica; é o que affirma, com toda a sua autoridade, o professor Marchoux, do Instituto de Pasteur de Paris.

O *Stovarsol* é um arsenical, o "composto 190" do Laboratorio Poulenc Frères e se administra em comprimidos.

Marchoux diz que a constancia dos successos therapeuticos o leva a publicar desde já a sua impressão.

(Biologie Médicale. 1923 p. 178).

Tratamento da syphilis do lactante

(M. Pinard — Bulletin Médical — 1923 — n.º 7.)

Constará de injeccões de 914, endovenosas ou subcutaneas. As endovenosas na jugular interna, nas veias epicraneas ou no seio longitudinal superior.

As doses serão, para um recém-nascido, de 0,005 mil., 1 cgr.; 1 cgr. 5; 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 cgr.; sendo as injeccões feitas com intervallos de 3 a 4 dias.

21 dias depois, far-se-á a segunda série com doses mais fortes; o tratamento será continuado em séries successivas com 21 dias de repouso, até desaparecerem os signaes clinicos e serologicos.

Um lactante heredosyphilitico deverá ser assim tratado, por series successivas, durante um a 2 annos, ás vezes mais.

O tratamento pelo bismutto, no lactante, está ainda em ensaio.

O mercurio, acha M. Pinard, deve ser o medicamento de excepção e se prestou grandes serviços, permittiu, no entanto, que o mundo ficasse cheio de dystrophicos, asthenicos e tarados mentaes. E' porque a luta contra a syphilis hereditaria deve ser conduzida com precisão por tratamentos tão intensos quanto methodicos e bem regrados, que se fará mais, por este tiro indirecto, para a diminuição da tuberculose e do cancer, do que por todos s meios actualmente empregados.

A. D.

O auctor chama a attenção para o *syndrome epigastrico*, que sobreviria nas primeiras seis horas do ataque e precederia, assim, os signaes classicos da fossa iliaca direita.

O doente queixa-se de uma dôr forte epigastrica e vomita frequentemente, permanece em decubito dorsal.

Ha uma sensibilidade especial, localisada na região epigastrica esquerda superior, com espasmo muscular do grande absorpção ao seu nivel de productos extremamente toxicos. motores na região epigastrica, precisamente como se tratado provoca um reflexo hypotensor, que vae pelo plexo solar, e que é de natureza vagotonica.

Parece que o *syndrome epigastrico* dependa de uma excitação hyper-aguda do pneumogastrico.

E' um *syndrome* precoce e passageiro e, por isso, quasi nunca observado em hospital, onde os doentes já chegam com os phenomenos iliacos.

A. D.