

realização da *MEDICINA SOCIAL* nos seus multiplos aspectos.

A lucta contra a toxicomania se impõe. A campanha saneadora não deve ficar sómente limitada á acção da policia.

Contra o mal apavorante, devem irmanar-se todas as forças activas do paiz.

Sobre os miseraveis exploradores da saude, applicuem-se as penalidades que a lei faculta.

Para os intoxicados sejam creados os serviços de assistencia, e aos mesmos faça-se sentir a acção do medico, sem reservas, tornando-os conhecedores da desgraça que os aguarda.

O medico numa campanha persuasiva,

carinhosa, calando lentamente o terreno, aos poucos apagará as lareiras parciais do vicio.

Isolado, sem o auxilio da acção activa da policia, a sua acção de nada valerá, e, ludibriando de toda e qualquer iniciativa, a fonte do veneno estará sempre ao alcance dos infelizes por elle algemados.

Combinadas, conjugadas as acções do medico e dos poderes publicos, organizando-se o serviço de assistencia aos intoxicados, será possivel salvar innumeros infelizes já á beira da miseria organica, da morte moral, ou na marcha accelerada, em caminho do termo final da vida.

A. G.

**Acceitamos a permuta com qualquer das
Revistas Medicas Nacionais ou Exrangeiras**

Opothierapia suprarenal — Journ. de Medicine de Paris — 5-4-926.

Os professores Lereboullet e Gournay põem em evidencia a influencia da opothierapia suprarenal no tratamento das diphtherias graves.

Veau confirma a opinião de Lereboullet que empregou aliás um extracto suprarenal concentrado, associando tambem á sorotherapia a estrychnina.

Netter, Lesné apresentam identica opinião, isto é, salientam a vantagem do emprego da opothierapia suprarenal na diphtheria.

★

A calcemia na tuberculose — Segundo Philip B. Matz, no soro o valor em calcio varia de 9 a 12 milligrammas (media 10,28). Quando as lesões pulmonares coexistem com alterações de nephrite parenchymatosa chronica, esta cifra desce a 9,22. Certos saes de calcio, o oleo de fígado de bacalhão estimulam sobremodo o metabolismo calcico.

★

Montemartini — não reconhece especificidade absoluta á nova reacção sorologica de Wassermann, para o diagnostico da tuberculose em actividade. Obteve aquelle auctor elevado numero de reacções

negativas, nas tuberculosas torpidas adiantadas, e em formas cirurgicas fistulosas. Os soros de individuos syphiliticos fornecem frequentemente reacções positivas.

São estas em poucas palavras as conclusões a que chega Montemartini na sua contribuição ao estudo da nova reacção sorologica proposta por Wassermann para o diagnostico da tuberculose em actividade.

Após alludir a varios methodos especificos, accredita G. Causadé et André Tardieu (Les Maladies de l'Appareil respiratoire et la Tuberculose pulmonaire —) Le Mond Médical — 15 Fev. — 1.^{er} Mars 1926 n.º 683 — que a analyse dos numerosos trabalhos presos ao diagnostico da tuberculose em actividade, permita dar um valor dignostico nos diversos procesos de laboratorio, desde que varios dentre elles sejam concordantes.

Assim a cuti-reacção forte e precoce, a prova da sedimentação globular, a soro reacção de Besredka ou de Wassermann, a pesquisa da formula leucocytaria, por exemplo, fornecem resultados, incontestavelmente de valor, segundo o auctor, do estudo na apreciação geral. Entende porém que esta conclusão, não é susceptivel de ser aproveitada na pratica, e que o diagnostico sorologico da tuberculose em actividade não foi ainda resolvido.

