

La mortalidad de las complicaciones quirúrgicas em la diabetes — W. Morris Weeden — The Journal Of The American Medical Association. E.E. V. 11. No. 8.

O A. procura determinar a influencia da insulina sobre as complicações cirúrgicas do diabetes. Para isso confronta a mortalidade, de 160 casos tratados no Hospital New York de 1897 a 1922 com a de 12 internados durante os annos de 1922 (2.º semestre) e 1923. Na 1.ª serie houve 59 obitos, o que dá a mortalidade de 36,8 por cento. Deduzindo 14 obtidos em que o A. considera bastante a doença cirúrgica para produzir a morte, resultaria uma mortalidade de 28,1 por cento. Na 2.ª serie, embora pequena os doentes tiveram os beneficios da insulina: houve 2 obitos seja uma percentagem de 16 6. Ainda esses dois obitos se poderiam attribuir antes á doença cirúrgica que ao diabetes: homem de 77 annos, com gangrena da perna, fallecido 5 horas depois da amputação; mulher de 60 annos com empyema consecutivo a pneumonia e fallecida sem operação. Dos 9 doentes que sobreviveram houve 3 que pareciam votados á morte, si não fôra a intervenção da insulina;

um caso de grande anthraz do dorso, outro de abcesso profundo da parede thoracica e ulcera de decubito e o 3.º de hernia umbilical estrangulada, tendo estado todos os 3 em coma mais de 24 horas. D. B.

★

P. Werner (Vienna) (W. kl. W. 2). Exame radioscopico em mulher gravida deu a impressão de 2 columnas vertebraes autorizando diagnostico de gravidez dupla. Poucos dias mais tarde deu á luz feto unico, já macerado e que media 41 cm. de comprimento. Autor pensa que sombras attribuidas á 2 columnas eram devidas á costellas.

★

G. Rosenberg (Frankfurt a. M.) Dilatação em ampola do canal cystico. (Arch. f. kl. Ch. 125, 1 e 2). O autor observou uma dilatação do canal cystico numa menina de 2 annos — que continha 360 cm de liquido bilioso e pensa tratar-se de uma deformidade congenita que attribue ao parto (apresentação de nadeegas.)

★

ANTISEPTICO

BACTERICIDA

COMO CURATIVO E PARA HYGIENE INTIMA DAS SENHORAS

GYROL

A BASE

$\text{CH}_2 \text{O}_2, \text{C}_3 \text{H}_7 \text{C}, \text{BO}_3 \text{H}_3 + \text{AL}_2 \text{K}_2 \text{SO}_4 24 \text{H}_2 \text{O}$
TRIOXYMETHYLENE BRANCO, PARAMETILISOPROPILFENOL
E ACIDO ORTHOBORICO

Nem toxico, nem caustico

Receitado com muito resultado nas vaginites, bartolinites, metrites, salpingo-ovarites e leucorréas
ACÇÃO ANTIPHLOGISTICA MANIFESTA

Em caixas com 20 papeis   A' venda nas boas Pharmacias e Drogarias
Amostras e Litteratura a disposição dos Senhores Medicos

Pedro Baldassarri & Irmão — Caixa Postal 847 — S. Paulo