

combinando-se os dados clinicos das chamadas colloidoclasias, com os esclarecimentos de ordem physico-quimica trazidos por Lumière e Kopaczewsky; no estudo dos phenomenos colloidaes é que encontraremos a causa essencial do phenomeno do choque.

Anaphylaxia, colloidoclasia, idiosyncrasia, são tres termos que se prestam a mais facil confusão, maximé no terreno da sua intima interpretação.

Todos os tres termos, no terreno da

clinica, reflectem o phenomeno do choque. Todos são phenomenos colloidoclasticos, apenas a anaphylaxia representa uma modalidade, uma variante.

A' luz dos colloidos, pois, nas reacções de ordem essencialmente physico-quimica é que encontraremos a causa essencial do phenomeno, que, embora ainda não bem desvendado, todavia já invadiu o terreno da therapeutica, alimentando mesmo a esperança de modificar algo dos legitimos estudos de immunologia. **A. G.**

Nota previa

Las céphalées hypophysaires — Stéphen Chauvet — Jornal dos Clinicos — Anno V. No. 7.

O autor assigna 5 variedades de cephaléias hypophysarias: cephaléia dos tumores da hypophyse; cephaléia de crescimento; cephaléia menstrual; cephaléia dos melancolicos; cephaléia da menopausa. A 1.^a é conhecida ha 15 annos. As outras 4 muito pouco conhecidas. Muito importaria ao clinico saber diagnostical-as, não só por serem „extremamente frequentes“ como pelos effeitos notaveis que sobre ellas exerce a opotherapie adequada. Todas ellas seriam causadas pela hypertrophia da glandula, hypertrophia secundaria á alteração ou á perturbação de outras glandulas endocrinas, sobresaindo entre todas as glandulas genitales. Supprimida a acção enfreadora das ultimas sobre a hypophyse, surgiria a hypertrophia desta. Na cephaléia de crescimento, além da ausencia dos signaes de outras causas de cephaléias, levaria ao diagnostico um estado anormal da morphologia geral e da evolução pube-ral: morphologia eunchoide com macrosce-

lia; hypotrophia dos órgãos genitales; atro- so ou insufficiencia dos caracteres sexuaes secundarios, face e psychismo infantis. A cephaléia menstrual manifesta-se com o fluxo catamenial ou 2 dias antes. Apura-se que taes doentes foram menstruadas tardia- mente, têm tido regras irregulares e dolo- rosas, apresentam certo grau de hypertro- phia adiposa, perturbações circulatorias pe- riphericas e um breve tempo de perturba- ções psychicas durante o periodo catame- nial. Nos melancolicos, a cephaléia é por vezes atroz, alternando com sensações de que a cabeça se acha vazia ou crescida (tête vide, tête pleine); ha perturbações vasculares, theomicas e secretorias conco- mitantes. Quanto á cephaléia da menopau- sa, o A. assigna uma condição que a aggrava: a hypertensão arterial (às vezes incipiente). Em todos os casos se deve fazer intensiva e prolongadamente o tratamento opotherapico genital (orchitico ou ovarico) de accordo com a pathogenia referida aci- ma; seus resultados seriam notaveis.

D. B.

★

Urgencia Medica

em caixas de 18 empolas sortidas,
do

Laboratorio Clinico Silva Araujo

encontra-se no escriptorio de **Fausto Sant'Anna**

Rua 15. de Novembro n. 27 - PORTO ALEGRE

PREÇO 9\$000 - PELO CORREIO MAIS 1\$000