

No combate

aos **coccus pyogenicos** estão causando successo dois grandes preparados chimotherapeuticos:

Trypaflavina

USO ENDOVENOSO

Gonorrhéa doses iniciaes de $\frac{1}{2}\%$ 5 ccm
passando depois para 2% 5 ccm

SEPTICEMIA

FORUNCULOSE

TYPHUS ABEDOMINALIS

} sol. de 2% 5 ccm e mais

Antisepcia circulante perfeita.

Optima tolerancia.

Caixas com 5 amp. de $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}\% \text{ 5 ccm.} \\ 2\% \text{ 5 ccm.} \end{array} \right.$

Pó „pro injectione“, vidros de 10, 25 e 50 grs.

„A Trypaflavina é o „914“ da gonorrhéa.

Rivanol

USO EXTERNO

Desinfectante pan-therapeutico de acção profunda e da superficie

Antisepsia das cavidades

Tratamento de feridas purulentas

Lavagens urethraes, vaginaes, intestinaes etc.

Não irrita o tecido

Tubos com 20 compr. de 0,1
Vidros de 10 e 25 grs.

Peçam amostras e litteratura á:

A Chimica Industrial „Beyer-Meister Lucius,“ Weskott & Cia.
Rua das Flores n.º 2 — PORTO ALEGRE — Caixa postal 75 — Teleph. 5223

