

Syphilis secundaria:

- 1 — Na cura habitual, sempre necessaria, de reforço a acção dos arseno-benzenos ou dos bismuthicos soluveis, contemporaneamente ou logo após o emprego daquelles medicamentos.
- 2 — Nos doentes intolerantes aos arseno-benzenos.
- 3 — Nos casos de lesões resistentes aos arseno-benzenos.
- 4 — Nos casos de manifestações que recidivam, após os arseno-benzenos.
- 5 — No tratamento de consolidação, durante dois ou tres annos, após as curas energicas, feitas no começo da infecção.

Syphilis terciaria:

- 1 — Nos casos de manifestações syphiliticas cutaneas, mucosas, osseas, etc., particularmente nos arseno-intolerantes, arseno-resistentes, ou arseno-recidivantes.
- 2 — No tratamento da syphilis visceral, especialmente nas manifestações nervosas e cardio-vasculares, quando do medicamento se requer tolerancia e acção gradual persistente.

Syphilis latente:

- 1 — Nos casos de recidivas, tardias em que houver indicação do tratamento de segurança (Gougerot).
- 2 — Nos casos de reacção de Wassermann ou de alterações do liquido cephalo-rachidiano, difficilmente reductiveis.



O melhor substituto do leite materno. Recomendado com grande sucesso pelas autoridades medicas de todo o mundo.

Amostras e literaturas

C.^{ia} Nestle

Caixa postal 602

PORTO ALEGRE

Dr. Raul Moreira

Professor da clinica de crianças da Faculdade de Medicina.

Consultorio: Rua dos Andradas, 246, das 2^h 1/2 às 4.
Residencia: Felix da Cunha, 1136. - Telephone 961.

Dr. Diogo Ferrás

Professor da Faculdade de Medicina.

Clinica de olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Consultorio: Rua Riachuelo n.º 329 e Brangança n.º 91 (Sobrado), das 10 às 12 e das 4 às 6.

Dr. Thomaz Mariante

Clinica Geral

Estomago, coração e rins.

Consultorio: Rua dos Andradas 495, das 16 às 18 h.

Dr. Sarmento Leite Filho

Prof. de Pathologia e Clinica Medica da Faculdade
Doenças internas e nervosas

Consultorio: Andradas n. 395, às 17 horas. Residencia: S. Raphael, 112.