

CARBY

CARBONATO BASICO DE BISMUTHO EM SUSPENSÃO OLEOSA

Dez centigrammos de bismutho metallico por centimetro cubico

Formula prescripta pelo prof. Eduardo Rabello, cathedratico de clinica dermatologica e syphiligraphica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

O carbonato basico de bismutho e o oleo puro e neutro em que é emulsionado são obtidos nos laboratorios Silva Araujo, sob a proficiente direcção technica do prof. J. Carvalho Del Vecchio, cathedratico de chimica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Milhares de injecções, prolongadamente seguidas em seus effeitos na clinica daquelle professor, e na de outros distinctos medicos demonstram as seguintes

VANTAGENS:

- 1.º — Facil homogeinisação, pela tenuidade do pó.
- 2.º — Ausencia absoluta de dôr.
- 3.º — Absorpção moderada e eliminacão gradual.
- 4.º — Acção segura, constante e duradoura em todas as manifestações da syphilis.
- 5.º — Ausencia de reacções locais.
- 6.º — Absoluta tolerancia, junta a energica acção therapeutica.

POSOLOGIA

Cada empôla de CARBY contem, em um centimetro cubico de oleo de olivas puro e neutro, a quantidade de 0,122 cent. de carbonato basico de bismutho, correspondente a 10 centigrammos de bismutho metal.

MANEIRA DE USAR

O CARBY deve ser empregado de accordo com a indicacão medica para cada caso. Em regra geral devem ser dadas 2 a 3 injecções semanaes, equivalentes a 20 ou 30 centigrammos de bismutho metallico, até chegar-se a dose total de duas e meia a tres grammas de bismutho metal, seguindo-se, após, um repouso de um a dois mezes, conforme o caso. Se as condições do doente o exigirem, pode ser feita uma pausa de duas semanas após as primeiras doze injecções, fiando-se na absorpção gradual e persistente do carbonato de bismutho; noutras condições poderá ainda ser applicada metade da dose habitual, ainda bastante activa. Applicado o CARBY como reforço á acção dos arseno-benzenos ou dos bismuthicos soluveis, deve ser usado na dose de vinte centigrammos de bismutho metallico (duas empôlas), em uma ou duas injecções semanaes, simultaneas ás daquelles medicamentos. Quando se preferir a applicação de series simultaneas de injecções de arseno-benzenos ou bismuthicos soluveis e de CARBY, como reforço, deve este ser empregado da maneira ordinaria, acima exposta, até a dose total de duas e meia a tres grammas de bismutho metal.

O rithmo das injecções e, sobretudo, das series de injecções, deve ser indicado pelo medico, de accordo com o caso.

As injecções devem ser intra-musculares, de preferencia na parte alta das nade-gas, e feitas com a technica habitual, aconselhada para as suspensões oleosas.

INDICAÇÕES DO CARBY

Syphilis primaria:

- 1 — *Nas curas abortivas, como reforço á acção dos arsenicaes em injecções ou series de injecções simultaneas, sempre que esta actuação, de todas a mais energica, for possivel.*
- 2 — *Como reforço a acção dos bismuthicos soluveis, nas curas abortivas, quando os doentes forem intolerantes aos arseno-benzenos.*

Syphilis secundaria:


- 1 — *Na cura habitual, sempre necessaria, de reforço a acção dos arseno-benzenos ou dos bismuthicos soluveis, contemporaneamente ou logo após o emprego daquelles medicamentos.*
- 2 — *Nos doentes intolerantes aos arseno-benzenos.*
- 3 — *Nos casos de lesões resistentes aos arseno-benzenos.*
- 4 — *Nos casos de manifestações que recidivam, após os arseno-benzenos.*
- 5 — *No tratamento de consolidação, durante dois ou tres annos, após as curas energicas, feitas no começo da infecção.*

Syphilis terciaria:

- 1 — *Nos casos de manifestações syphiliticas cutaneas, mucosas, osseas, etc., particularmente nos arseno-intolerantes, arseno-resistentes, ou arseno-recidivantes.*
- 2 — *No tratamento da syphilis visceral, especialmente nas manifestações nervosas e cardio-vasculares, quando do medicamento se requer tolerancia e acção gradual persistente.*

Syphilis latente:

- 1 — *Nos casos de recidivas, tardias em que houver indicação do tratamento de segurança (Gougerot).*
- 2 — *Nos casos de reacção de Wassermann ou de alterações do liquido cephalo-rachidiano, difficilmente reductiveis.*

**Uma lubrificação eficiente prolonga
 a duração de qualquer motor. Os lu-
 brificantes  „BALTIMORE“
 não temem concurrencia em preço,
 nem em qualidade.**

Dr. Raul Moreira

Professor da clinica de crianças da Faculdade
de Medicina.

Consultorio: Rua dos Andradas, 246, das 2¹/₂ às 4.

Residencia: Felix da Cunha, 1136. - Telephone 961.

Dr. Diogo Ferrás

Professor da Faculdade de Medicina.

Clinica de olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Consultorio: Rua Riachuelo n.º 329 e Brangança
n.º 91 (Sobrado), das 10 às 12 e das 4 às 6.