III

O „Syndicato Medico Rio-Grandense“ deve aproveitar a tradicção e autoridade da Sociedade de Medicina de Porto Alegre, fazendo com que o Syndicato seja um desdobramento daquella em tres grandes departamentos, sem prejuizo de centralização:

a) Departamento scientifico,
b) Departamento de medicina social,
c) Departamento de defesa da classe.

Rio Grande, Abril de 1928.

Moção

O I.º Congresso Municipal de Saude Publica, medicina Social e Hospitaes, reunido na cidade do Rio Grande appela á Sociedade de Medicina de Porto Alegre no sentido de promover a creação do „Syndicato Medico Rio-Grandense“, emprestando-lhe o seu integral apoio, e formula vótos de que no II.º Congresso Municipal a realizar-se no proximo anno já se possa celebrar entre as conquistas da classe medica do Rio Grande do Sul a sua organisação syndical.

OXYUROS

E' notoria a inefficacia da medicação interna contra os oxyuros. E' que estes parasitas, depr eferencia, habitam o grosso intestino, sobretudo o recto. E' de suppor que, pelo longo trajecto atravez do tubo gastro-intestinal, os anthelminticos percam a sua acção, talvez por decomposição ou por absorpção. Nem mesmo o Buhilan parece ter resolvido o problema.

Até agora, o tratamento mais efficaz consistia em grandes lavagens intestinaes de leite no qual haviam sido fervidos alguns dentes de alho. Apezar de medicação caseira, é de bons resultados, tanto que ha 30 annos nosso mestre Professor Rocha Faria já as preconizava.

Ha uns 2 annos, encontrei, em um jornal leigo, uma noticia referente a um novo anthelmintico contra essa especie de parasitas intestinaes, tendo-o empregado em bom numero de casos, sempre com optimo resultado.

Trata-se da cenoura crua. O paciente deve comer duas no 1.º dia e duas no segundo. No 3.º dia tomará um laxante.

Penso ser de vantagem mandar ingerir as cenouras em jejum, recommendar boa mastigação e talvez uma certa dieta, como se costuma fazer com os outros anthelminticos.

A progenitora de duas mocinhas, para as quaes, após varias outras tentativas infructiferas, institui o novo tratamento, teve a boa idéa de passar as cenouras num ralo. O effeito foi espantoso.

Vantagens do tratamento: é efficaz, o paciente acceita-o com a maior boa vontade, sobretudo as creanças, e é absolutamente inoffensivo. E já que estamos marchando para a epocha das comidas cruas, elle se coapta perfeitamente ás imposições da *moda* que se inicia. **F.**

Meio pratico e indolor de reduzir a paraphimose

Dr. K. Deichsel, Breslau.

Partindo do principio de que o obstaculo á reducção da paraphimose reside, não no annel formado pelo prepucio, e, sim, no edema da glande, o autor mostra a facilidade da reducção si conseguirmos fazer desapparecer esse edema.

O meio realmente é simples. Emprega-se uma fita de borracha, de 50 a 75 cm. de comprimento sobre 1 a 1½ de largura. Um pedaço da conhecida tira de Esmarch para a ischemia dos membros, reduzida ás necessarias proporções, presta-se admiravelmente a esse fim.

Sem exaggero de pressão, envolve-se a glande com a tira que, pela sua elasticidade, vae aos poucos determinando o desapparecimento do edema.

A cabo de 15 a 20 minutos, a reducção é facil, tendo ainda a vantagem de ser indolor e não sangrenta.

Só nos casos mais antigos e naquelles em que houver infecção ou ameaça de mortificação, é preciso recorrer á incisão do annel constrictor.

F.

Dr. Carlos Leite

Prof. da Faculdade de Medicina

Molestias internas, syphilis e pelle

Consultorios: Ph. do Indio, ás 9 horas. Pharmacia Carvalho, ás 15 horas.

Residencia: Voluntarios da Patria, 515. Teleph. 88.

Os „Archivos Rio Grandenses de Medicina“ acceitam annuncios de preparados, casas de material de laboratorio, cirurgia, automoveis, etc. etc.

A Revista sahirá mensalmente e terá grande circulação em todo o Brasil, em especial no Rio Grande do Sul.

Os pedidos de annuncios devem ser dirigidos para a caixa postal n.º 442 — Porto Alegre.