

deveria pronunciar o Dr. Jacyntho Gomes, impossibilitado que foi de comparecer por molestia subita. Termina apresentando á Sociedade, em nome da Directoria, frater-naes saudações.

O Dr. Argymiro Galvão saúda o Dr. Jacyntho Gomes. Falla o Dr. Guerra Bless-

mann vice-presidente que presidiu a sessão, agradecendo aos Drs. Carlos Bento, Gastão de Oliveira, Carlos Hofmeister, Raul Moreira e Raul Bittencourt o concurso valioso que prestaram á Sociedade. A nova Directoria foi cumprimentada por todos os presentes.

Observações sôbre o sarampo experimental. (*Beobachtungen bei experimentellen Masern*), por F. GOEBEL. — *Zeitschrift f. Kinderheilkunde*. Bd. XLIV. H. 1/2. (Transcripto da Rev. Lisboa Médica N.º 12 — Ano V — Dezembro 1928).

Meneses.

Refutando a opinião de que vinte e quatro horas depois da aparição do exantema, o sarampo deixa de ser contagioso, o A. refere fac-

tos que mostram que no quarto dia do exantema, o sarampo é transmissível pelas vias habituais, e que o sôro do doente extraído no segundo dia da erupção é ainda capaz de reproduzir a doença no individuo a quem fôr injectado, a-pesar da adição de 1% de Yatren e da conservação prolongada na geleira. Nêste último caso apparecem os fenómenos nasofaríngeos habituais, o que parece indicar que êsses fenómenos prodrômicos são a expressão da infecção das mucosas pela eliminação do germen na sua superficie, e não por penetração inicial, como muitos creem.

Acceitamos a permuta com qualquer das

Revistas Medicas Nacionais ou Extranqueiras

**Para as
CRIANÇAS:**



**O melhor
LEITE EM PÓ**

Porque, modificado pela addicção de lactose em proporções convenientes e reduzida a proteina, sua composição chimica é a ideal pela semelhança com a do leite materno.

Porque, homogeneizado, de modo a lhe serem reduzidos os globulos de gordura, é portanto ideal, tambem sua composição physica, garantida assim sua mais absoluta digestibilidade.

Os Srs. medicos, queiram pedir amostras e brochuras gratis, á

Cia. Nestlé

Caixa postal 602 — PORTO ALEGRE.