

nosso, o estado das mycoses é da mais alta importancia pela facil contaminação dos individuos, que se dedicam aos trabalhos da lavoura.

XVIII

A Aspergillose pulmonar pôde estar associada ao cancer do palmão, (Observação do Prof- Jacintho Gomes).

XIX

Dada a frequencia de cogumelos do genero Monilia nos catarrhos recentes de tuberculosos, e principalmente do augmento delles no periodo terminal, faz considerar que esses cogumelos representam um papel importante na evolução da infecção bacillar.

XX

É indispensavel que se faça a prophylaxia collegial, visando o diagnostico dos casos de tinhas, altamente contagiosos.

XXI

O Keriön pode ser confundido com uma infecção estrepto-estaphylococcica. (Caso da clinica do Dr. Hugo Pinto Ribeiro, diagnostico deste illustre dermatologista). A observação clinica foi confirmada pelas culturas de cogumelos negativas nos meios glycosado e conservação de Sabouraud e pelo isolamento dos estreptococcus e estaphylococcus em tubos de gelose-sôro.

Trata-se de uma menina de cinco annos de idade, branca, residente em Porto Alegre. (Vide fig. 14).

NOTAS RADIOLOGICAS

Dr. Saint Pastous.

RESUMO DAS REVISTAS

PRESSE MÉDICALE — 6-3-929

Zimmern et Me. Bande -- Radiobiologie et radiotherapie des surrenales pg. 297

1º) Etiologia dos estados hypertensivos.

Ao lado da hypertensão de origem cardio-renal os autores referem as seguintes modalidades:

a) Hypertensão nos desequilibrios do systema vegetativo (nos ergasthenicos, instaveis, pletoricos, intoxicados alimentares).

b) Hypertensão nos disturbios endocrinicos (menopausa, castração cirurgica e roentgeniana).

c) Hypertensão no hyperfuncionamento suprarenal (hyperepinephria). Diversos autores relatam casos de hypertensão em que foram constatadas pela autopsia ectados de hyperplasia e tumores das suprarenaes.

d) Fórmas complexas, em que não se pôde definir a verdadeira causa.

2º) Hypertensão e radiotherapia.

A therapeutica da hypertensão arterio-renal fracassará quando a origem desse

syndroma estiver num disturbio do systema nervoso vegetativo ou do aparelho endocrinico.

Nestes casos, é necessario combater a irritabilidade do sympathico, o hyperfuncionamento das suprarenaes, e tentar a regressão dos tumores, quando existirem.

A radiotherapia possui, muis ou menos, essas propriedades. Os autores concluem que a irradiação da região suprarenal, maximé nos individuos indemnes de lesões arterio-renaes, abaixa, até certo ponto, a tensão arterial, melhorando e fazendo cessar as perturbações funcioneas (cephaleia, vertigem, zumbidos, etc.)

As pesquisas experimentaes realizadas até agora, ainda não permitem estabelecer o verdadeiro fundamento radiophysiológico, e os resultados dessas investigações são discordantes alguns, contradictorios outros.

Segundo alguns autores, doses pequenas de raios de Roentgen elevam a taxa de adrenalina, e doses mais altas produzem effeito contrario.

Atenção

A Comissão organizadora rio-grandense tem a honra de solicitar a adesão do distinto collega á secção de Medicina e Hygiene Infantis do 10º Congresso Brasileiro de Medicina, a reunir-se no Rio de Janeiro, de 30 de Junho a 7 de Julho de 1929, muito empenhando-se pelo seu comparecimento e apresentação de um trabalho scientifico.

Dr. Manoel Gonçalves Carneiro,
presidente.

Dr. Raul Moreira,
vice-presidente em exercicio.

Dr. Luiz Osorio Nogueira Flores,
vice-presidente da sub-secção
de pediatria cirurgica.

Dr. Florencio Ygartúa,
secretario geral.

Correspondencia e adhesões devem ser dirigidas ao secretario geral, **Dr. Florencio Ygartúa**, rua Moinhos de Vento, 393, Porto Alegre, ou caixa postal 265.

Porto Alegre, Março de 1929.

(Transcripto a pedido)

**Para as
CRIANÇAS:**



**O melhor
LEITE EM PÓ**

Porque, modificado pela addicção de lactose em proporções convenientes e reduzida a proteina, sua composição chimica é a ideal pela semelhança com a do leite materno.

Porque, homogeneizado, de modo a lhe serem reduzidos os globulos de gordura, é portanto ideal, tambem sua composição physica, garantida assim sua mais absoluta digestibilidade.

Os Srs. medicos, queiram pedir amostras e brochuras gratis, á

Cia. Nestlé

Caixa postal 602 — PORTO ALEGRE.

As lesões produzidas pelas irradiações atingem de preferencia a camada cortical das capsulas, ficando quasi indemne a região medullar.

Sendo a ração medullar que produz a adrenalina, parece não ser legitima a acção moderadora dos raios de Roentgen na secreção da adrenalina. Entretanto, outros autores admittem que a camada cortical, que é a atingida pela irradiação, participa tambem da função segregante das capsulas suprarenaes.

3.º) Factos clinicos.

Cottenot conclue, em sua these:

Emquanto nas hypertensões puras a irradiação das suprarenaes produz resultados favoraveis (diminuição da tensão arterial, melhora dos signaes funcçionaes), em compensação nos arterio-escleroses e nos albuminuricos só temos observado effeitos incertos ou nullos.

Resumo de 3 observações:

P. 67 annos — Rigidez dos membros — Clangor aortico — nem cepheleia, nem vertigem, nem zumbidos, nem albumina — Ureia sanguinea 0,55. Ambard 0,15. Tensão pelo Pachon: 26 — 14.

Tres sessões de radiotherapia (dias 15,17 e 20 de Março de 1928). Tensão: 26,21,21 e 18, ficando estacionaria entre 18 e 20 varios mēzes.

L. 51 annos — Cepheleia occipital — Vertigens — Zumbidos. Dôres lombares — Fadiga. Ligeiro clangor aortico — Polakiuria nocturna- Ureia sanguinea 0,57.

Insucesso de todos os tratamentos anteriores.

Tensão maxima 32 (Pochon).

Cinco sessões de radiotherapia — Desapparecimento da cepheleia, lombalgia e fadiga. Queda da tensão de 32 para 22. Depois de 3 mēzes, subiu a 24 — Nova

irradiação. Ha 15 mēzes permaneceu estavel em 22 a mx. e 12 a mn.

R. 64 annos — Cepheleia — Insomnia — Arterias duras.

Tensão 28. Após a irradiação, a tensão cahe a 21, com grande melhora dos signaes funcçionaes.

Modo de acção.

A interpretação do mecanismo physioradiologico ainda está no terreno das hypotheses.

Presse Médicale, 6/3/929.

Irradiation de la Région surrénale dans l'hypertension artérielle et dans les Artérites oblitérantes.

Langeron et Desplats. Pg. 299.

Depois de relatarem diversas observações clinicas, os autores chegam ás seguintes conclusões:

1.º) A radiotherapia da região suprarrenal é um methodo therapeutico que parece absolutamente ser isempto de perigo.

2.º) Na hypertensão continua solitaria, sua efficiencia é discutivel como agente hypotensor, mas é real como modificador dos symptomas clinicos.

3.º) Nas hypertensões paroxysticas ella é realmente effizaz.

4.º) Nas arterites oblitérantes, com perturbações trophicas, dolorosas, a irradiação da região suprarrenal modifica sensivelmente todos os symptomas e perturbações.

TECHNICA.

Porta de entrada: Zona paravertebral entre a D⁴ e L³ (12 cm. x 12 cm.) — Fil-tros: 6 — 10 mm.

Al. Dose: 2600 R por campo.

E possivel que maiores aperfeiçoamentos de technica venham a dar resultados mais completos.

Os „Archivos Rio Grandenses de Medicina“ aceitam annuncios de preparados, casas de material de laboratorio, cirurgia, automoveis, etc. etc.

A Revista sahirá mensalmente e terá grande circulação em todo o Brasil, em especial no Rio Grande do Sul.

Os pedidos de annuncios devem ser dirigidos para a caixa postal n.º 442 — Porto Alegre.