

e) Alguns empregam o regimen da passa de ameixa, em jejum, diluida n'agua. Mas é um regimen mal escolhido para a ulcera.

f) Certos doentes, tomando 200 a 300 c. c. de crême de leite, quando o ha fresco, e quando bem tolerado, conseguem, variando as doses, um effeito satisfactorio. Tomar a quantidade escolhida em duas ou tres doses. Suspender no dia seguinte, si houve mais de uma evacuação, mesmo sem mal estar; para evitar a irritação que do contrario viria.

g) Os suppositorios de glicerina, ex-

cellentes theoricamente, irritam o estomago, tendem a augmentar os espasmos.

RESUMO.

O *melhor meio* consiste em combater os espasmos pelo calor; usar nujol; ingerir manteiga em quantidade, com pouco *swiback*, *mellin's foot*, ou bolachinha de mayzena; usar muito crême de leite fresco, de preferencia não pasterizado; ingerir, em jejum, duas horas antes da primeira refeição, um copo de agua de S. Lourenço, magnesiana, quente, ou outra agua semelhante.

Theses novas

Hysteropexia ligamentar pelo processo de Gilliam-Adeodato.

These de doutoramento. J. Adeodato Filho.
Bahia, 1929 (*Approvada com distinção*)

Não raro succede que approvações distinctas surjam appensas a trabalhos dessa natureza, sem que entretanto taes trabalhos façam jús a essa prova de merito.

No caso, porém, em apreço, o contrario se verifica em toda extensão, por isso que resaltam, através da modestia com que se apresenta o autôr nesse trabalho, os seus elevados merecimentos, que collimam no facto de ter conscientemente estudado um processo, que fartamente merece a denominação de Processo de Adeodato.

Após o capitulo I, em que traça com firmeza as considerações preliminares sobre o assumpto, aborda no capitulo II a technica operatoria, consoante memoria apresentada pelo eminente Prof. Adeodato ao 8.º Congresso de Medicina e Cirurgia, realizado em Outubro-1918 no Rio de Janeiro, salientando, no emtanto, pormenores e variantes, colhidos no curso da sua observação pessoal. No dominio da technica, aliás de primeira importancia num estudo dessa natureza, o autor é rigorista, tendo tido aliás oportunidade de praticar 4 vezes o processo de Adeodato.

Os tres capitulos seguintes, em que se encontram consubstanciados as annotações á technica operatoria, resultados immediatos e remotos e apreciações criticas, condensam o que de mais interessante e opportuno se torna evidenciar nesse ter-

reno, dando grande valia á capacidade de observação e de critica do autor.

Por fim, como remate, o capitulo das observações num total de 156 e muito bem documentadas. Os Archivos Rio Grandenses de Medicina cumprimentam o Dr. Adeodato Filho pelo seu interessante trabalho e congratulam-se com o illustrado Prof. Adeodato, pela brilhante oportunidade de ter sido seu processo mais uma vez preconizado, sob bases tão rigorosamente scientificas.

P. E.

Um caso de molestia de Addison e de diabetes assucarado, simultaneos. —

JOHN H. ARNETT (*Arch. of Int. Med.*, 39: 698, maio de 1927). — Transcripção da *Organotherapia* n.º 4, 1929.

A coincidência da molestia de Addison e do diabetes é excessivamente rara. Além de que, ella tem um grande interesse, porquanto as duas glandulas accometidas, as suprarenaes e as ilhas de Langerhans, secretam hormonas de effeitos glycemicos oppostos. O caso relatado por Arnett apresentava symptomas clinicos e chimicos de diabetes, ao mesmo tempo que a pigmentação, a asthenia, a hypotensão e os vomitos, característicos da molestia de Addison. A autopsia confirmou o diagnostico. Foram encontradas difficuldades therapeuticas fóra do commum, devidas á existencia duma hyper-sensibilidade á insulina, e a uma tendencia marcada á ketose, sendo a primeira devida, sem duvida, a uma insufficiencia supra-renal.