

só muito pouco, não provoca tendencias para hemorragias, o pulso não é influenciado desfavoravelmente o musculo cardiaco e os vasos sanguineos não são atacados pelo pernocton; não foram observadas alterações dos rins, bexiga, figado ou outros órgãos importantes. O pernocton annula a acção do encephalo sobre os centros sobcorticaes, de modo que o somno é provocado sem que sejam affectados os centros importantes, situados profundamente. A irritabilidade reflexa permanece intacta. A administração endovenosa do pernocton não produz dôr alguma. O medicamento so deve ser empregado nos casos em que se pôde contar com uma evolução normal do parto. Não é necessario fazer qualquer preparação previa da parturiente, nem é preciso empregar qualquer medicamento. Basta uma preparação psychica: convem a parturiente estar com o estomago vazio para evitar vomitos e as dentaduras postizas devem ser retiradas. Nas primiparas faz-se uma injeção quando o côlo do utero está alargado de 5 a 6 cm e a parte anterior do corpo da creança entra na bacia. Nas multiparas basta uma dilatação do côlo de 4

em ou quando o colo dê passagem a 2 dedos. A posologia está determinada segundo o schema de R. Bumm: dá-se 1 cc de pernocton para cada 12½ kg. de peso do corpo, desde que o estado geral não contraindique esta dόse. A injeção faz-se lentamente, para 1 cc de pernocton gastar-se há 1 minuto. Faz-se a injeção; após uma contracção uterina. Distinguem-se 3 periodos do somno provocado pelo pernocton: somno preliminar, somno propriamente dito e o periodo consecutivo ao somno. A hypnose obstetrica dura 2 a 3 horas. Em 500 casos de emprego do pernocton só houve 2 intervenções de Forceps. A amnesia depois da applicação do pernocton é ideal é completa. Nunca foi observado caso de morte com o pernocton. Contra-indicações quasi que não existem. A idade dos parturientes não tem importancia alguma. Só em raros casos são necessarias 2 injeções, bastando 2,2 cc para a 2ª injeção. A hypnose obstetrica deve ser feita só nas clinicas, pois as parturientes devem ser vigiadas cuidadosamente e largamente pelo medico.

L. M.

EXIJA O

Café Nacional

como garantia de
um producto puro

COLITES - DIARRHEIAS NAS CRIANÇAS - GASTRO ENTERITIS - AGNÉ - MELHORA A DERMATOSE - IMPEDE FERMENTAÇÕES PUTRIDAS NO INTESTINO - EVITA A AUTO-INTOXICAÇÃO INTESTINAL.

COMPRIMIDOS

BIOLATOL

FERMENTO LACTICO

PREPARADO NO

LABORATORIO QUIMICO BIOLOGICO

PORTO ALEGRE

YBERTUS