

Résumé de l'examen histologique d'un processus néoplasique rare*)

Par **Antão de Assis Brasil** (Diplômé de l'Université de Lausanne (Suisse), Ancien Assistant à l'Institut d'Hygiène e de Bactériologie de l'Université de Fribourg en Suisse. Médecin praticien à Santo Angelo (Est. Rio Grande do Sul, Brésil.)

Par son aspect macroscopique, la pièce examinée ressemble à un Noevus pigmentaire verruqueux (hypertrophique), mais de dimensions considérables.

L'examen microscopique montre cependant qu'il ne s'agit pas d'une mélanose simple, mais d'une néoplasie occupant toute l'épaisseur du derme cutané.

La couche papillaire de la peau est hypertrophiée et déformée. Les papilles, hautes et larges, ressemblent bien plutôt à des excroissances papillomateuses qu'à des papilles dermiques.

L'épiderme n'est pas épaissi; sa couche cornée se soulève ou se détache facilement; un stratum granulosum, bien que mince, existe en tout cas par places; la couche muqueuse (malpighienne) est par places abondamment infiltrée par du pigment noir, dans ses couches profondes principalement. On observe, en outre, des petits amas aplatis de pigment dans la couche desquamante même de l'épiderme.

Le tissu de la couche papillaire, comme aussi celui de couche sous-jacente, renferment de nombreux cordons, îlots, voire traînées, renfermant de cellules tassées, dont les dimensions et la forme ne sont pas identiques, et qu'ont une certaine ressemblance avec des cellules épithéloïdes. Ces amas cellulaires, dans la couche papil-

laire en particulier, sont abondamment pigmentés. Dans la couche sous-papillaire, l'infiltration devient bien plus diffuse et affecte la forme de traînées.

Les parties affectées renferment encore des follicules pileux et des glandes sébacées, comme aussi des glandes sudoripares.

Les follicules pileux montrent souvent à leurs parties profondes des altérations atrophiques, à la papille en particulier.

Les glandes sébacées annexées aux follicules sont généralement atrophiques et réduites à de grêles tendons. Aux glandes sudoripares, on peut encore reconnaître les parties glomérulées et le canal excréteur; ces glandes aussi sont plutôt atrophiques.

Le tissu interstitiel, interposé entre les parties profondes des follicules pileux et les glandes, se compose d'une trame nettement fibreuse mais semée de cellules mentionnées plus haut, à propos de la néoplasie; la vascularisation de ce tissu interstitiel n'est nullement très abondante. On y trouve encore passeblement de Mastzellen, voire clasmatoctes.

Encore plus profondément, c'est-à-dire à la place de l'hypoderme dans la peau normale, on ne trouve pas de pannicule adipeux, mais une trame fibreuse serrée.

Le 24 Août 1930.

*) La pièce biopsique a été enlevée par nous de la région sous-épineuse de l'épaule gauche d'une jeune-fille d'origine allemande âgée de 14 ans.

Medicos do Interior!

Quando vierdes a Porto Alegre, visitae a sede do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul, á rua General Camara

|264, 3º andar.

Lá encontrareis um ambiente amistoso e agradavel. Verificareis, tambem, como o Sindicato trabalha pela união e engrandecimento da classe. Para isso elle necessita da colaboração de todos. Enviae sem demora, a vossa adhesão.