

sobre a vaccina de Umeno e Doi, que nos enviou no anno passado e até agora não recebemos. Será publicado logo que chegue ás nossas mãos.

Instituto Ezequiel Dias (Bello Horizonte). Recebemos a importancia da assignatura para um anno.

Dr. José Athanasio (São Jeronymo). Idem, idem.

Dr. José Lisboa (São Gabriel). Aguardamos as notas que vos solicitamos.

Dr. José Mendonça (Pelotas). Idem, idem.

Dr. Mauricio Infantini (Bagé). Idem, idem.

Faculdade de Medicina de Porto Alegre

Realisaram-se no corrente mez de Setembro, concursos para livre docencia de diversas cadeiras. Inscreveram-se nos mesmos e foram aprovados:

dr. Oddone Marsiaj, clinica obstetrica;

dr. Jacy Carneiro Monteiro, clinica cirurgica e

dr. Ivo Correia Meyer, ophtalmologia.



REVISTA DAS REVISTAS



Tratamento dos bubões pelas injeções de leite esterilizado. *E. Kromayer* (Berlin). — *Klin. Wochenschrift*, N.º 51, 1929.

Apesar de muito conhecido, esse tratamento ainda se não vulgarizou sufficientemente.

Kromayer apresenta uma estatistica de 131 casos de adenites ligadas ao cancro venereo. De 45 casos tratados pelos meios usuaes, apenas 13 % escaparam á operação, ao passo que, dos 87 restantes, 67 % se restabeleceram sem intervenção cirurgica. E é preciso accentuar que, em quasi todos esses casos, já se notava um pouco de fluctuação, ao iniciar-se o tratamento pelo leite.

Technica: Leite bem fresco é fervido, durante 30 minutos, em banho-maria. Cõa-se por gaze esterilizada, afim de retirar os flócos que se possam ter formado. A injeção é feita nos musculos da região glutea, na porção supero-externa, um pouco abaixo da crista iliaca.

Geralmente bastam de 2 a 4 injeções, com intervallos de 3 a 4 dias. Conforme o estado geral do paciente, as primeiras doses são de 6 a 10 cc e as demais de 10 a 15.

Algumas horas após a injeção costuma apparecer febre que se póde elevar a 40° e mesmo mais, mas que durante a noite desaparece. Em consequencia dessa elevação thermica, o estado geral do paciente é um pouco abalado durante uns 2 dias, havendo tambem certa reacção local, no ponto da applicação da injeção, não podendo o doente deitar-se daquelle lado.

Em compensação, no 2º ou 3º dia as melhoras se iniciam. Dentro de 10 a 15 dias, os ganglios voltam a seu estado normal. Mesmo nos casos desfavoraveis, a formação do pús se precipita, podendo-se intervir mais precocemente. Cicatrização mais rapida.

A medicação pelo leite tambem influencia favoravelmente, tanto o proprio cancro como a balanoposthite que, por vezes, o acompanha.

Este tratamento simples deveria ser empregado, em todos os casos de bubões venereos, e o mais precocemente possivel.

Frederico G. Falk.

Tratamento da tuberculose laryngéa pela dieta de baço. — (*Wiener kl. Wochenschrift*, N.º 48, 1929).

Os excellentes resultados obtidos por Fliegel, em arthrites tuberculosas, por meio da ingestão de baço fresco (*Ars Medici*, 1928), animaram a F. Hutter (Vienna) a empregar a mesma therapeutica em 10 casos de tuberculose laryngéa.

Segundo as prescripções de Fliegel, os doentes ingerem diariamente de 80 a 100 grs. de baço de vitella. Sempre que fôr possivel, elle será administrado crú e bem picado. Poderá ser adicionado á sopa, comtanto que ella não esteja muito quente, ou então condimentado por temperos os mais variados, com ausencia de ovos, gorduras etc. Si assim mesmo houver repugnancia por parte do doente, o baço poderá ser assado muito ligeiramente, á semelhança do que se costuma fazer com o fígado.