

tes por inibição, cujo carater familiar se tem notado e na qual a sífilis, o alcoolismo dos ascendentes, aparecem com a sua relação, assim como as glandulas endocrinas (M. V-Pechéré).

12.º — Devemos esforçar-nos por prevenir estes accidentes dramaticos na criança, eliminando os fatores da predisposição, fazendo a profilaxia dessas mortes repentinas; talvez assim deixará de ser verdadeiro o resultado a que chegaram os autores citados, no Congresso de Paris (1929) “é impossível saber porque certos latentes morrem subitamente e de maneira imprevista”.

F. Y.

The American Journal of Surgery

Janeiro, 1932

Tribremetanol-amilenehidrato (avertina fluida)

Ernst F. Goldschmidt e A. M. Hunt — New Haven, Conn.

Comunicação de 314 anestésias administradas á 225 pacientes

Desde abril de 1930, o tribremetanol em amilenehidrato tem sido empregado no New Haven Hospital como anestésico geral, em 251 processos cirurgicos, no tratamento de 2 casos de tetano e 1 de coréa. A avertina foi instilada no réto numa solução de agua distilada á 2,5%, as doses variando de 0,08 a 1 gr. por kg. de peso, em pacientes de ambos os sexos entre as idades de 2 a 73 anos. O uso da avertina tem como contra-indicações as lesões parenquimatosas do figado e lesões extensas dos dous rins. Concluiu-se que administrada em doses suficientes, não inferiores á 0,08 por kg. de peso, ela produz boa anestesia. Sómente em 3,5% dos casos não foram observados resultados satisfatorios. Em 20% dos casos a anestesia geral era associada á anestesia local (novocaina); nos restantes casos foram empregadas varias combinações, durante a operação, com o éter, o etileno, o oxigenio, o protoxido de azoto. Em todas as circunstancias, a dose empregada de inalação anestésica suplementar foi uma fração da quantidade, geralmente, usada para uma determinada intervenção. Depois da instilação dava-se uma queda temporaria da pressão sanguinea sistolica, de cerca de 19 mm. Hg. nos homens e 28 mm. nas mulheres. As mudanças bruscas no curso do coração, produzidas por excitação no inicio e no fim da anestesia, foram acentuadamente pequenas ou praticamente ausentes. A mais notavel vantagem no uso desta anestesia é a completa amnesia observada em todos os pacientes, não se lembrando mais dos acontecimentos ocorridos após a instilação do anestésico.

Transplantação dos ureteres no rétosigmoide e cistectomia por extrofia vesical

Waltman Walters — Rocester, Minn.

Comunicação de 76 casos.

São relatados os resultados obtidos na transplantação dos uréteres na alsa rétosigmoidéa e a remoção da bexiga extrofiada, num gru-

po de 76 casos operados na Mayo Clinic. O método das transplantações foi usado primeiro por C. H. Mayo em fevereiro de 1912, aplicando o principio de Coffey. O áto operatorio é dividido em tres fâses: 1) transplantação do uretér direito no rétosigmoide, 2) duas semanas após, transplantação do uretér esquerdo, e 3) dez dias após, remoção da bexiga extrafiada. Em nenhum dos casos foram usados catetères ureterais na transplantação. Tres pacientes morreram no hospital em consequencia da intervenção. Vinte e set pacientes viveram cinco anos, e trinta viveram dez anos desde a operação. Sómente em tres casos os resultados não foram satisfatorios. Em 50% dos casos não houve evidencia de infecção renal. Em 21% houve curtos periodos de leve infecção renal; o intervalo, entre tais periodos em muitos casos, foi de muitos menses, algumas vezes de anos. A infecção, além disso, foi leve e de pouco efeito sobre o paciente. O uso de uroselectan ou de skiodan, intravenosamente, tornou possivel o estudo da função renal como o dos contornos do bacinete e do uretér, em muitos casos. O uso deste método e de outros que estudam a função renal, induz na convicção que a função renal é normal e que não ha dilatação no bacinete, nos calices ou nos uretères em que foi feita a transplantação ureterosigmoidal.

Simpatico-ganglionectomia lombosacra

Hiromu Ito	e	Goichi Asami
Kioto, Japão		Ehime, Japão

Foram apresentados 27 casos clinicos de trombo-angite obliterante com uma breve descrição da técnica operatoria, em que são retirados os ganglios lombar inferior e sacro superior com a porção intermedia-ria. E' dada uma breve descrição das experiencias laboratoriais no animal, mostrando o definitivo aumento no volume do fluxo sanguineo através o membro homolateral, e facilitação da cicatrização da ferida por esse meio. O tratamento do sindroma de trombo-angite é feito pela simpatico-ganglionectomia lombar e lombosacra, obtendo-se uma cura, aparentemente, permanente e completa quando a claudicação intermitente está no seu periodo mais recente. Com o desenvolvimento da gangrena e obliteração da arteria poplitéa ou tibial, doutro lado, o resultado da intervenção não é satisfatorio. Seria evidentemente, por isso, o caso de se operar em tais pacientes na fase mais recente da molestia.

Surgery, Gynecology and Obstetric.

Janeiro, 1932

Estudo celular da glandula tireoide

Gustav Zechel, Chicago.

Existem dous tipos de celulas no parenquina de glandula tereoide: 1) as celulas comuns da tiroide constituem o tipo dominante; 2) um outro tipo de celulas grandes (gigantes) é o menos frequente. Estas