

tes por inibição, cujo carater familiar se tem notado e na qual a sífilis, o alcoolismo dos ascendentes, aparecem com a sua relação, assim como as glandulas endocrinas (M. V-Pechéré).

12.º — Devemos esforçar-nos por prevenir estes accidentes dramaticos na criança, eliminando os fatores da predisposição, fazendo a profilaxia dessas mortes repentinas; talvez assim deixará de ser verdadeiro o resultado a que chegaram os autores citados, no Congresso de Paris (1929) “é impossível saber porque certos latentes morrem subitamente e de maneira imprevista”.

F. Y.

The American Journal of Surgery

Janeiro, 1932

Tribremetanol-amilenehidrato (avertina fluida)

Ernst F. Goldschmidt e A. M. Hunt — New Haven, Conn.

Comunicação de 314 anestésias administradas á 225 pacientes

Desde abril de 1930, o tribremetanol em amilenehidrato tem sido empregado no New Haven Hospital como anestésico geral, em 251 processos cirurgicos, no tratamento de 2 casos de tetano e 1 de coréa. A avertina foi instilada no réto numa solução de agua distilada á 2,5%, as doses variando de 0,08 a 1 gr. por kg. de peso, em pacientes de ambos os sexos entre as idades de 2 a 73 anos. O uso da avertina tem como contra-indicações as lesões parenquimatosas do figado e lesões extensas dos dous rins. Concluiu-se que administrada em doses suficientes, não inferiores á 0,08 por kg. de peso, ela produz boa anestesia. Sómente em 3,5% dos casos não foram observados resultados satisfatórios. Em 20% dos casos a anestesia geral era associada á anestesia local (novocaina); nos restantes casos foram empregadas varias combinações, durante a operação, com o éter, o etileno, o oxigenio, o protoxido de azoto. Em todas as circunstancias, a dose empregada de inalação anestésica suplementar foi uma fração da quantidade, geralmente, usada para uma determinada intervenção. Depois da instilação dava-se uma queda temporaria da pressão sanguínea sistolica, de cerca de 19 mm. Hg. nos homens e 28 mm. nas mulheres. As mudanças bruscas no curso do coração, produzidas por excitação no inicio e no fim da anestesia, foram acentuadamente pequenas ou praticamente ausentes. A mais notavel vantagem no uso desta anestesia é a completa amnesia observada em todos os pacientes, não se lembrando mais dos acontecimentos ocorridos após a instilação do anestésico.

Transplantação dos ureteres no rétosigmoide e cistectomia por extrofia vesical

Waltman Walters — Rocester, Minn.

Comunicação de 76 casos.

São relatados os resultados obtidos na transplantação dos uréteres na alsa rétosigmoidéa e a remoção da bexiga extrofiada, num gru-