

lho francês. 4. — Como pretendíamos a resolução do problema da falta de um aparelho. 5. — Primeira tentativa de aortografia praticada em nosso meio. 6. — Importantes conclusões advindas dessa tentativa. 7. — Grandes dificuldades que se nos depararam. 8. — Como conseguimos resolver este problema fundamental. 9. — O arteriografo Wallau—Osorio. 10. — Descrição do aparelho. 11. — Funcionamento do arteriografo.

Aortografia no vivo.

1. — Bases fundamentais sem as quais seria impraticavel a aortografia abdominal. 2. — O brodil. 3. — Preparo da solução. 4. — A explicação da fraca concentraço da substancia opaca em nossa primeira tentativa de aortografia. 5. — Punção da aorta e anestesia dos esplanenicos. 6. — Técnica radiografica. 7. — Nossas aortografias abdominais. 8. — Principais indicações da arteriografia da aorta abdominal.

Conclusões.

Resumo (em francês).

E' um ótimo trabalho, merecendo grandes elogios.

E. J. K.

Dr. Otavio Lupi Duarte — CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA REAÇÃO DE HINTON NO SÔRO-DIAGNOSTICO DA SIFILIS.

Tése de P. Alegre. Livr. do Globo. 1932.

Apresenta as seguintes conclusões:

- I. — Apresenta sobre certas reações de flocculação a vantagem do preparo do antígeno ser de técnica simples, assim como o seu doscamento dispensa verificações penosas e demoradas.
- II. — A leitura dos resultados é feita com grande facilidade, mesmo nas reações fracamente positivas e pôdem ser comparadas nos tubos testemunhas.
- III. — E' altamente especifica da infecção luetica para a qual apresenta grande sensibilidade.
- IV. — O material necessario para a reação é extremamente reduzido, não necessitando nenhum aparelho especial para a execução e leitura.

- V. — É mais sensível que Meinick e Kahn, pois a percentagem de concordâncias absolutas é de 99,31%.
- VI. — É completamente indispensável que a estufa esteja regulada a 37°, sem o que a leitura do resultado se torna difícil, senão impossível.
- VII. — A reação sêrologica de Hinton deve ser empregada na nossa prática diária, como está atualmente difundida entre os Americanos do Norte.
- VIII. — Necessita menos do que 1 cc. de sêro sanguíneo inativado, para a sua execução.
- IX. — A reação de Hinton, praticada antes e durante o tratamento, demonstrou uma curva decrescente paralelamente à intervenção terapeutica.

E. J. K.
