

Verrugas

por

R. di Primio

Sem visos de originalidade, contem o presente trabalho ligeiras considerações, em torno de numerosos casos de verruga por mim observados em diversos pontos dos municipios de Torres, Santo Antonio da Patrulha e Conceição do Arroio. Foi quando percorri essas localidades, desincumbindo-me de varias pesquisas parasitologicas e sanitarias, que esta afecção cutanea me chamou a atenção pela sua grande frequencia.

Dado o carater especial da excursão, não dispondo na ocasião do material necessario para as pesquisas exigidas, sem os informes clinicos sobre diferentes particularidades evolutivas, e ainda, além de tudo, falta de tempo, ficam por elucidar, como seria de esperar, questões que serão abordadas quando a oportunidade se apresentar.

Evolução

O acometimento de varias pessoas de uma familia por verrugas, mantendo-se uma ou mais indenes, e, o oposto como se observa frequentemente, isto é, a existencia de um caso de verruga, sem repercussão entre as demais, conduz a conjecturas sobre a questão do factor individual ou de transmissibilidade, si admitido fosse assim pensar.

Indolor em qualquer fase da evolução — salvo casos dependentes de certas localizações — ás vezes com leve prurido prodromico ou ligeira congestão inicial, lenta e progressivamente as verrugas crecem sem sintomas de repercussão geral, segundo as informações dos nativos.

Interessante é o fáto de um portador de verruga ficar suprendido, quando o interroguei sobre uma que até então lhe tinha passado despercebida.

Algumas aparecem e crecem com relativa celeridade para logo regredirem; outras se desenvolvem mais lentamente e permanecem durante anos (10 anos ou mais).

Quando traumatizadas tornam-se dolorosas e sangram com facilidade.

Seccionadas pela base como muitos naturais fazem com fim terapeutico, reconstituem-se em prazo variavel, que para alguns casos foi possivel determinar aproximadamente em dois meses.

Aspéto

As verrugas observadas apresentam-se com o aspéto seguinte: elevações cutaneas, algumas vezes pouco salientes, outras, bem proeminentes, ou estranguladas na base, de volume variavel, geralmente arredondadas, consistencia dura, superfície irregular, coloração parda mais ou menos escura.

Formas


Ao lado das formas verdadeiramente simples, traduzindo-se por uma ou mais verrugas, pequenas, discretas, ligeiramente elevadas, notam-se outras de grande intensidade caracterisadas pela confluencia dos elementos morbidos formando placas, que em grãos mais adiantados, reunidas ocupam grandes regiões, como tive ocasião de observar em um doente, que apresentava nos membros inferiores, quasi de maneira simetrica a partir do terço inferior das pernas, até ás extremidades dos dedos a pele completamente tomada e grande hipertrofia das regiões comprometidas.

Neste caso as verrugas bem salientes, quasi formando uma só placa, apresentavam disposição linear.

Localização

Com maior frequencia as verrugas localizam-se nos membros inferiores, nas pernas e pés, de preferencia, na face dorsal e em torno dos maléolos (fot. 1 e 2).

Quando observadas em outras partes do corpo, constatee que quasi sempre as primeiras aparecem nas regiões citadas, para depois sur-



Fot. 1 — Verrugas das extremidades inferiores.

girem, preferencialmente, nos antebraços, mãos e no rosto, e, neste ultimo, de modo especial na região mentoniana ou na proximidade dos olhos. Topograficamente as verrugas não guardam simetria.



Fot. 2 — Verrugas das extremidades inferiores.



Fot. 3 — Portadores de verrugas.

Entre estas excrecencias cutaneas, esparsas, isoladas ou de per-meio ás grandes placas a pele apresenta-se macroscopicamente normal.

Ás vezes, no inicio da evolução ou nos casos de certa intensidade, ligeira zona congestiva contorna os elementos jovens.

Idade

O seguinte quadro mostra a incidencia das verrugas conforme as diferentes idades, notando-se a maior predileção pelo periodo entre 8 a 18 anos, em um total de 38 casos, para só fazer referencia aos que foram melhor observados.

Casos observados

Idade	Numero de casos
3 anos	1
4 "	1
6 "	1
7 "	1
8 "	3
9 "	1
10 "	4
11 "	1
12 "	1
13 "	6
14 "	4
15 "	1
16 "	3
17 "	2
18 "	3
19 "	1
20 "	1
31 "	1
41 "	1
56 "	1

No Colegio Elementar da Vila de Conceição do Arroio, inspecionado tambem para outros objetivos, verifiquei muitos colegiais (fot. n.º 3) portadores de verrugas, assestadas nas regiões eletivas já assinaladas.

Profissão

Nenhuma conclusão se pode tirar quanto á influencia das profis-

sões nos individuos acometidos, pois, nas zonas onde o mal é difundido, as populações quasi se limitam aos exiguos afazeres da pequena agricultura e da criação.

Côr

Poucos casos observei nos pretos e mistos, o que aliás não pode também servir para fundamentada conclusão, dada a baixa percentagem de individuos de côr habitantes daquelas paragens.

Nestes, tanto as verrugas como as respectivas cicatrizes, apresentam-se com coloração mais viva e intensa.

Recidivas

Parece haver pouca tendencia ás recidivas neste terreno morbido. Em um doente de 31 anos de idade, que aos 9 anos teve varias verrugas que desapareceram aos 15, ultimamente uma pequena surgiu-lhe no polegar esquerdo, de evolução lenta, aspéto atípico, plana e de côr esmaiada.

Cicatrizes

As cicatrizes são geralmente planas ou ligeiramente deprimidas, arredondadas ou alongadas, base não endurecida. São em alguns casos, principalmente quando antigas, quasi imperceptiveis.