

Ensaio de interpretação da bratestesia laringéa

por

Alvaro Barcellos Ferreira

A importancia dos sintomas não é a mesma nos diversos estados morbidos. Ha estados banais, comuns, equivoccos, encontrados nas mais diversas afecções e que não nos permitem uma orientação diagnostica, e ha sintomas especiais, univocos, patognomonicos, proprios e particulares a certos e determinados processos patologicos, a tal ou qual doença, e que nos dão indicações seguras e precisas.

A bratestesia laringéa parece-me que deve ser colocada entre os da 2.^a categoria, dada a sua importancia toda especial, que resalta da descrição que nos acaba de fazer o professor Tomaz Mariante.

Por ela se vê que este novo sinal tem não só importancia diagnostica como tambem prognostica e serve ainda como orientador de uma terapeutica que visará impedir o aparecimento de certas syndromes particularmente graves.

Representa a bratestesia laringéa um sinal de alarme que precede a crise dramatica da asma cardiaca, a crise brutal, tragica e angustiante do edema agudo, da submersão pulmonar.

Enquadra-se, assim, no grupo dos paroxismos dispneicos funcionais, intimamente ligada á asma cardiaca, ao edema agudo e como eles, por consequencia, dependendo da mesma causa, do mesmo fator desencadeante, a insuficiencia aguda do ventriculo esquerdo.

Não vamos aqui analisar com minucias o modo como age a distensão subita do ventriculo esquerdo, as suas causas determinantes, a influencia do esforço ou do factor sono que cream condições favoraveis ao desencadear deste desfalecimento, em que o coração baqueia nesta luta ingloria, traído por seus comparsas, ciosos de sua hehemonia e que, solapadamente, procuram dificultar sua tarefa, creando embarços e resistencias perifericas.

Queremos simplesmente focar certos pontos mais importantes e esta localização especial.

Naturalmente, temos que recorrer á interferencia do sistema nervoso, por excitação vago-simpatica, com predominancia vagal, para explica-los. A irritação vago-simpatica capaz de determinar a asma, o edema agudo, é capaz tambem, quando menos intensa, menos acentuada, de provocar a bratestesia laringéa que corresponde, provavelmente, a um certo grao de edema laringeo.

E' talvez uma simples questão de quantidade, aliada naturalmente a outras circunstancias momentaneas. E esta localização particular no laringe se explica pela intima ligação que existe entre o coração e o laringe por intermedio do laringeo superior e inferior.

Além disso, sabemos que os órgãos inervados pelo vago são intimamente ligados entre si e aptos para com rapidez se influenciarem reciprocamente, pelos reflexos (Potenger).

A influencia nitida da intoxicações, principalmente do fumo, se explica por sua influencia toxica eletiva sobre o sistema nervoso, especialmente sobre o simpatico.

Talvez devamos fazer intervir o factor constitucional congenito ou adquirido creando condigões de menor resistencia para o lado do laringe que reage assim, em certos individuos, ás excitações cardiacas, ou interpretar esta localização com a doutrina das estesias vago-simpaticas parciais de Castelino e Pende.

E' assim a bratestesia laringea um sinal de alarme da insuficiencia aguda do ventriculo esquerdo, uma pequena crise paroxistica que precede os grandes paroxismos dispneicos, e que obedece ao seu mesmo mecanismo de ação e á sua mesma interpretação patogenica.