

rett — The Lancet, vol. CCXXVII, n.º 5802, 10 de Novembro de 1934, pg. 1046.

As retenções post-operatorias de urinas constituem sem duvida uma das complicações mais incomodas com que se pode ver um cirurgião.

O cateterismo vesical que resolve com facilidade a retenção tem o defeito de correr o risco de infecção e de ter que ser repetido.

Em 414 doentes operados o A. encontrou a retenção de urina em 9% dos homens e 7% das mulheres.

Depois de se estender em minuciosas considerações chega a conclusão que a retenção post-operatoria não pode ser completa e definitivamente resolvida pelo uso do catéter, mas si o instrumento é passado antes da bexiga estar anormalmente distendida, quando o paciente sente as primeiras dificuldades, dois terços dos casos serão aliviados definitivamente sem inconveniente algum e o terço restante pode ser tratado pelos processos comuns. A passagem do catéter como medida profilatica não tem valor algum. O catéter não deverá ser usado em doentes que tenham uma infecção das vias urinarias.

O mais energico medicamento contra
 os **espasmos dolorosos** do
 pyloro, do colon, da vesicula biliar, dos bronchios
 (asthma), dos ureteres, do utero, etc.

ATROVERAN

SEM ENTORPECENTES

A base de papaverina, belladonna, meimendo e boldo.
 XX a XXX gottas por 2 a 3 vezes ao dia.

Lab.^{rio} Gross - Rio