

Segundo Tossi, ao contrario de alguns autores argentinos, que não attribuem as mesmas proporções de gravidade á malária na Provincia del Alto Paraná e Misiones — esta ultima de particular interesse para nós — o impaludismo adquire nessas regiões um caracter pernicioso, onde as formas dominantes são de terça e quarta e 60% de formas mixtas.

Ainda com referencia ás latitudes e para provar a elasticidade dos factores decorrentes das condições geographicas anormaes, é interessante assignalar que S. Mazza e F. Calera Vital, verificaram um caso de sezonismo autochtone em La Quiaca (Argentina) a 3.442 metros de altura.

Especies de hematozoarios da Argentina.

Penna e Barbieri incluem no seu livro “El Paludismo” a estatística dos exames hematologicos effectuados em 1914 nos “Laboratorios Regionales” em um total de 30.419 nas provincias de Tucuman, Salta, Jujuy e Catamarca onde as formas parasitarias se apresentam nas seguintes proporções: .

Plasmodium vivax	66,0
Plasmodium malariae	15,2
Plasmodium precox	15,7
Formas mixtas	2,85

INSTITUTO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA

Cilrobi

SAL SOLUVEL DE BISMUTHO
CADA EMPOLA CONTEM 0.026g. DE BISMUTHO METALLICO
MEDICAÇÃO INDOLOR E ATOXICA PARA INJECCÃO INTRAMUSCULAR
TONICO ESTIMULANTE ESPECIFICO ENERGETICO