

Notas terapêuticas

ESTERILISAÇÃO RÁPIDA DAS LESÕES CONTAGIOSAS DA SÍFILIS, SOB A AÇÃO DA BISMUTOTERAPIA EM ALTAS DOSES. DOSES.

Milian, Boule Mansour — *Revue Française de Dermatologie et Vénérologie*, n.º 6, pag. 346—352, junho de 1935.

Os AA. relatam os resultados obtidos com o bismuto em altas doses.

Os ensaios foram feitos em 21 doentes. Destes, 6 receberam o butilolaurato de bismuto (neocardil) das doses habituais, isto é, 7gr. 5 de bismuto metálico, duas vezes por semana. Os outros 15 receberam-no em doses duas vezes mais concentradas, isto é, Ogr. 15 de bismuto metálico, duas vezes por semana.

Nos 6 doentes, tratados pelas doses habituais, se constatou o desaparecimento dos treponemas, após duas injeções de neocardil, isto é, 4 a 7 dias depois da primeira injeção. Cinco desses doentes tinham caneros e o outro tinha sífilis secundária.

No que concérne aos 15 doentes, tratados pelas doses altas, em 7 dentre êles os treponemas desapareceram após uma única injeção da preparação bismutica. As lesões foram, portanto, esterilizadas na metade do tempo gasto pelos doentes submetidos às doses habituais de bismuto.

Os resultados foram menos bons em outros 8 doentes. Contudo, compararam-se êles aos obtidos pelos doentes que receberam o bismuto na dose habitual.

As altas doses foram em geral, bem suportadas. Apenas estomatites mui fugazes surgiram em 4 doentes.