

6 — Este tipo de alopecia traumatica, embora não demonstrativo, é um forte argumento em favor da teoria do professor Baliña que quer ver na alopecia de Sabouraud uma alopecia traumatica por tração dos cabelos.

Ainda com a palavra o dr. Hugo Ribeiro passou a mostrar a fotografia de uma mulher com lesão inicial de sífilis localizada na face lateral da região mentoniana. Referiu-se também ao caso de lesão idêntica situada no lábio superior de uma criança de 2 anos, caso este citado na sessão passada da Sociedade de Medicina.

Encerrou o dr. Hugo Ribeiro suas considerações com comentários em torno da sífilis extra genital.

O dr. Armin Niemeyer, depois de felicitar o conferencista, ressaltou o valor do trabalho que a casa acabava de ouvir, tanto mais interessante em face da escassa literatura existente sobre o assunto.

Igualmente o professor Mario Tota teve palavras elogiosas sobre o trabalho do dr. Hugo Ribeiro.

Antes de encerrar a sessão, o presidente marcou a ordem do dia para a próxima reunião e que será uma conferência do dr. Mario de Assis Brasil sobre o tema “Idéias atuais sobre a epidemiologia e tratamento da paralisia infantil”.

Porto Alegre, 26 de junho de 1936.

Helmuth Weinmann — 1.º secretario.

GLYCOSORO

O melhor contra a fraqueza
organica, sobretudo quando
houver retenção chloretada
Uma injeção diaria ou em dias alternados

SÔRO GLYCOSADO
PHOSPHO-ARSENIADO
COM OU SEM
ESTRYCHNINA

Laboratório
Gross
Rio de Janeiro