

pressão do fenomeno dôr a tal ponto, que bem se poderia dizer um processo indolôr.

A locomoção propria, em seguida ao ato operatorio, depende, é claro, da anestesia empregada. Os raquianestesiados são os que esgotam o praso de 12 dias. Os operados sob anestesia local, recuperam-na mais cedo, por volta do 7.^o dia.

A técnica de Pitanga Santos, suprime os famosos drenos e as prescinde de suturas: O enfermo fica sem os seus mamilos, perdendo um volume sanguíneo que não vae a 200 c. c. e sem levar um unico ponto de sutura.

Tudo isto são fatos. Não se trata de asseverações gratuitas. E' quanto está firmado, após algumas centenas de intervenções e facil de constatar por quem se queira dar ao trabalho de usar o método indicado.

Acredito que brevemente, possa Pitanga Santos vir ao Rio Grande, como é de seu pensamento, exhibir pessoalmente a sua técnica e passar na têla, os dois *films* que já possui e que exhibiu á classe medica do Rio de Janeiro e de S. Paulo.

Os dois métodos têm indicações proprias: Ambos resultam bem, se conscientemente empregados, sendo que o cirurgico é superior aos classicos e que, com o advento do novo, teem de ser fatalmente abandonados.

Eis, meus presados colegas e conterraneos, o que numa palestra — e não conferencia — vos poderia relatar.

Ao illustre Prof. Mario Totta, que com raro brilho preside os destinos desta Instituição, agradeço comovido as expressões generosas com que me distinguui e a honra que deu ao seu modesto colega em recebendo-o nesta casa, onde só se entra para aprender — e muito.

A Adayr Figueiredo, seria difficil responder.

Falou por ele, um coração de excepcionais limites, a serviço de uma sólida amizade.

Excedeu-se em bondade, á custa da generosa convivencia que em todos encontrou. Mandantes e mandatario, fôram além, nas ordens e na execução, cumulando em abundancia de sentimentos a quem não os valia e não os merecia.

A todos, o meu sincero e profundo agradecimento.

NEURILAN

*Poderoso calmante do
sistema neuro-vegetativo.*

Indicado na excitação nervosa,
nos desequilíbrios vegetativos,
taquicardias, palpitações, insomnias,
dyspepsia nervosa.

À base de estrôncio bromado,
crataegus, leptolobium, meimendo.

Dose: 1 a 2 colheres de chá em água
assucarada às refeições.

NÃO DEPRIMENTE

NEURILAN

Lab. Gross-Rio