

Das revistas

DESENVOLVIMENTO DA CIRURGIA NORTE-AMERICANA

(Fortschritte der amerikanische Chirurgie)

de *Dr. José K. Narat* — Chicago

(Zblt. f. Chrg. — 1936 — n.º 13 — pag. 739)

Campbell, Meyerling e Coley discutiram no ultimo Congresso da Sociedade Norte Americana de Medicina, os tumores osseos primarios. A classificação dos tumores osseos por eles apresentada, foi a seguinte:

	Benignos	Osteoma Osteocondroma Condroma Tumor de celulas gigantes
Tumores osteogeneticos		
	Malignos (sarcoma)	Osteolitico Condromixoma Condrosarcoma Fibrosarcoma Osteoblastico
Tumores não osteogeneticos — Malignos		Mieloma endotelial (Ewing) Mieloma Fibrosarcoma periostico

Ewing declarou-se contrario á biopsia, em se tratando dos tumores osseos malignos, pelo perigo das metastases, mas Meyerling aconselha a biopsia para facilitar o diagnostico precoce.

Os tres autores acima mencionados usam a toxina de Coley no caso de mielomas endoteliais (Ewing). Empregam-na tambem para evitar as metastases dos sarcomas osteogeneticos.

Morrison estudou 200 casos de perfurações agudas de ulceras gastro-duodenaes: 195 homens e 5 mulheres. 25% não tinham apresentado sintomas anteriores de ulcera; 15% não tinham tido vomitos e 9% nem náuseas tinham tido. 50% dos casos tinham ainda algumas horas após a perfuração, temperatura, pulso e respiração normaes. Mortalidade post-operatoria 21%.

Kendall, após estudos iniciados ha $1\frac{1}{2}$ anos, conseguiu preparar dois extratos de suprarenal, que dão, segundo este cirurgião, os melhores resultados na molestia de Addison. Pela relação que afirma ter com a tiroxina, acha Kendall que eles devem dar bons resultados na tireotoxiose aguda, afirmando que em breve iniciaria experiencias nesse sentido. Aconselha o emprego dos mesmos no preparo cirurgico de pacientes com Addison.

Na Clinica de Mayo, a raquianalgesia pela novocaina com preparo de efedrina, é usada especialmente em pacientes que se apresentem com diabetes, afegões renaes, tuberculose pulmonar evolutiva, bronquiectasias, enfisema pulmonar, asma, bronquite crônica.

Mathews e Schnabel, reltam os resultados de interessantes estudos post-mortem realizados em casos de cancer do esofago e afirmam que em 20% dos casos o neoplasma não tinha levado a estenose.

R. Jaffé, combate a afirmação do aumento constante dos tumores malignos primarios do pulmão.

F. C. Messer e R. H. McClelan, afirmam que a reação da osteomielite tratada pelas larvas da mosca "*Lucilia Siderata*", é mais alcalina que a da tratada sómente pelo sôro fisiológico, que é de ph-7,4. Usam larvas vivas esterilizadas.

R. Zollinger, dilatando as vias biliares, após colecistostomia, por meio duma pera de borracha (com manometro) adaptada a um dreno de borracha colocado na vesicula biliar ou no coledoco, conseguiu provocar sómente dores ao nivel do epigastro. Conclue afirmando que as outras irradiações dolorosas na colecistite, com ou sem colelitiase, são devidas ao processo inflamatorio em si e não a distensão das vias biliares.

L. F. Sise preconisa o ciclopropano (antigo trimetileno) como anestesia ideal nas tireoidectomias.

Contrariamente a Messer e McClelan, Simmons usa uma substancia que extrae das larvas da mosca "*Lucilia Siderata*", substancia esta de fonte ação bactericida sobre o estafilococo aureo, o estreptococo hemolitico e o clostridium Welchii.

Judd e Hoerner estudam as ulceras pepticas do jejunio, que na Clinica de Mayo aparecem em 2,8% dos casos de gastro-jejunostomias. Acham que o metodo de Billroth I deverá ser preferido ao de Polya, nos casos de ulcera peptica do jejunio.

Cleveland nega a artrite tuberculosa primaria.

Secco Eichenberg, Setembro de 1936.

NOVIDADES NO MUNDO CIRURGICO NORTE-AMERICANO

(Neues aus der chirurgischen Welt in Amerika)

de *Dr. José K. Narat* — Chicago

(Zblt. f. Chrg. — 1936 — n.º 18 — pag. 1057)

Kline elogia o processo de Stewart no tratamento da osteomielite. A' uma solução a 0,25% de trinitrofenol em agua distilada, adiciona-se 8% de glicerina. Os tecidos são pulverizados com esta solução. Em seguida

a ferida é tamponada com uma solução esterelizada de 20,0 de carbonato de calcio em 215,0 d'agua distilada.

Claude S. Beck, relata as novas aquisições no terreno da cirurgia "Plastica" do coração. Novos vasos sanguíneos cardiacos são executados a custa de pericardio, musculos toraxicos (grande peitoral e intercostaes) e grande epiploon (puxado atravez do diafragma). Procuram formar uma circulação cardiaca colateral nos casos de esclerose coronaria adiantada. Sucesso operatorio em 50% das operações.

Narat aconselha como antisético a solução a 1% de verde brilhante em 65% de alcool. Seu valor nas epidermofitoses é surpreendente.

Robison realça o valor da dosagem da fosfatase no caso do diagnostico dos tumores osseos. No caso de tumores benignos a taxa é normal.

Dragstedt, por experiencias em cães, chega a conclusão que a causa primaria da ulcera gastrica é a influencia quimica do suco gastrico, tendo a infeção ou a hipermotilidade papel secundario.

Balfour da Clinica de Mayo, após estudar as tecnicas operatorias empregadas em 1086 casos de ulceras duodenaes cronicas, afirma ser a gastro-entero-anastomose a intervenção de escolha.

Lahey afirma que a ulcera gastro-jejunal reconhece como causa os seguintes fatores: diatese ulcerosa, hiperacidez, infeção, má tecnica operatoria e tratamento medico insufficiente.

G. L. Cran preconiza o cloreto de ferro nas queimaduras; nas flietenas usa pincelagem da tintura e nas queimaduras ulceradas usa a seguinte solução:

Tint. cloreto de ferro	15,0
Hidroxido de sodio	0,30
Agua distilada	30,0

A "ileíte" descrita em 1932 por Crohn, tem tomado vulto e é caracterisada por um processo inflamatório granulomatoso, ulcerado e estenosante da parte terminal do ileon. Terapeutica quasi exclusivamente conservadora, raramente cirurgica.

E. A. Graham estabeleceu a seguinte seriação para as metastases do carcinoma pulmonar: figado, suprarenal, cerebro, rim, pancreas, baço e esqueleto osseo.

Rogoff contraria a opinião de Crile sobre o resultado da secção dos nervos das capsulas suprarenaes nos casos de molestia de Raynaud, de gangrena expontanea, de hipertensão, epilepsia, ulcera gastrica, bocio toxico, diabetes, etc. Igualmente Rogoff contra-indica a extirpação parcial das supra-renais e a irradiação roentgeniana das mesmas. Perigo de molestia de Addison.

Secco Eichenberg, Setembro de 1936.