

Dr. med. Gert Heilbrunn — “Zur frage der parasymphathitonische Umstellung des Organismus oder sympathikotoniken während der Insulinschockbehandlung der Schizophrenie (Sobre a questão da disposição parasimpaticotonica ou simpaticotonica do organismo durante o tratamento da Esquizofrenia pelo choque insulínico — In “Idem”.

Resumo: As *curvas glicemicas* tomadas de 32 pacientes mostraram uma queda durante o tratamento da manhã.

Em relação ao *quadro hematológico*, observou-se um leve desvio para a esquerda. Os *leucocitos* se apresentaram com um aumento contínuo, até depois da interrupção do tratamento (13 casos). Em 6 casos foi observado, fazendo-se contagens cada quarto de hora após a inj. de insulina dentro dos 5 primeiros quartos de hora, depois de um pequeno aumento uma leve diminuição com posterior reaumento.

A *velocidade de sedimentação* dos eritrocitos permaneceu constante em todas as fases (20 pacientes).

A dose de insulina não teve influencia na importancia das alterações citadas.

O pulso (cerca de 2500 curvas de 46 pacientes), a pressão diferencial (25 pacientes) e o metabolismo basico (25 pacientes) **aumentaram** com o aumento da hipoglicemia e mostraram um nitido paralelismo com o quadro clinico.

As pesquisas falam não por uma *vagotonização* pela hipoglicemia, mas ao contrario, por uma *simpaticotonização*, que se poderá muito bem explicar por uma descarga compensadora de adrenalina.

M. Karacik.

Drogaria Gavioli & Cia.

Rua Uruguay 303 e 307

Especialidades farmaceuticas

Nacionais e Estrangeiras.

Productos chimicos dos melhores fabricantes.

Herbas medicinaes.