

NUCLEOSYL (IBI)

Nucleinato duplo de Mn e Ca

INDICAÇÕES: anemias, chloroses, neurasthenias, depauperamentos orgânicos, fraquezas congênitas, infecções crônicas, estados post-infecciosos.
Em todos os casos de descalcificação do organismo.

DOSE: uma ampôla (via hypodermica) ao dia; duas nos casos graves.
Crianças, $\frac{1}{2}$ ampôla ou mais, conforme a idade.

Instituto Biochimico Italo-Brasileiro Ltda.

Caixa postal 2893 — S. Paulo

CRISTALLOVAR (IBI)

HORMONIO FOLLICULAR CRYSTALLIZADO
TITULADO PHYSIOLOGICAMENTE EM U. I.

Em solução alcoólica para uso oral

Em solução aquosa para uso hypodermico

Por via oral: — 40 gotas (300 U. I.) duas ou mais vezes ao dia, preferivelmente em bebida alcoólica, com o estomago vazio.

Por via hypodermica: — uma ampôla (2.500 U. I.) ao dia ou em dias alternados ou bisemanal.

Util associar os dois tratamentos, por injeções e PER OS

NAS DEFICIENCIAS OU FALTA DA FUNÇÃO OVARIANA —
MENOPAUSA

Instituto Biochimico Italo-Brasileiro Ltda.

Caixa postal 2893 — S. Paulo