

Região rica de vasos, de tûnicas delgadas, e, por isso mesmo, francamente vulneravel, o duodeno ulcerado deu-nos essa violenta hemorragia tóxica, fiel ao primeiro e, até agora unico tratamento. Testemunha insuspeita desse diagnóstico é o Laboratorio de pesquisas, que ao quinto, ao decimo quinto e ao trigesimo dia nos demonstra ainda globulos vermelhos nas fezes, revelando com essa fórmula oculta o sitio da lesão duodenal. A manifestação permanente de hemorragia oculta durante alguns mezes, satisfaz plenamente ao diagnóstico. Já seria tempo de uma radiografia. Já. Entretanto, além dos divertículos, si os houver, e que muita vês mascaram a imagem ulcerada, outros fatores concorrem para a negatividade da película. Tambem é dever do pediatra adiar os incomodos, que porventura estejam destinados aos doentinhos, mais ainda quando não é urgente a indicação. Muito mais satisfaz ao perscrutador o exame sistematico das fezes, que apresentam o certificado da lesão. A' última dessas pesquisas, de cinco dias passados é menor a hemorragia oculta. A todas essas, não tem a paciente sinão o regimen próprio de suas idade, com moderada prescrição terapêutica. E nós, que lhe haviamos dado o mercurio, na tolerada fórmula de latato neutro, já aos primeiros dias suspendemo-lo, mediante as pesquisas procedidas no sangue materno. A interessante criança, que agora ultrapassa em muito a curva normal de seu peso, manifesta nas suas funções, nas suas linhas, na sua cor e no seu genio, a conquista de uma nova e promissora existência.

