

CONCLUSÕES

Mister é, portanto, para que a reativação biológica das reações de Wassermann e de contraste aumente de valôr, e o seu resultado mereça fé, sejam seguidas certas nôrmas, acima expostas, e que, á guisa de conclusões, recapitularemos aqui:

- 1.^a) A reativação deverá ser praticada na sífilis ignorada, ou clinicamente latente, sempre que a reação de Wassermann e as de contraste tiverem sido previamente negativas.
- 2.^a) Somente, então, deverá ser tentada a reativação, praticando-se, de preferencia, uma ou duas injeções de 914 (0,15 e 0,30), ou oito a dez de mercurio ou bismuto.
- 3.^a) O sangue será examinado, no minimo, quinze dias depois da ultima injeção, por isso que a reação, para ser considerada especifica, tem de ser persistente.
- 4.^a) Nos casos duvidosos, com reação fraca e ausencia de sinais clinicos, o exame deverá, para maior segurança, ser repetido um mês após a ultima injeção. Só, então, se continuar positivo, será o seu resultado considerado especifico.

GLYCOSORO

O melhor contra a fraqueza organica, sobretudo quando houver retenção chloretada
Uma injeção diaria ou em dias alternados

SÔRO GLYCOSADO
PHOSPHO-ARSENIADO
COM OU SEM
ESTRYCHNINA

Laboratório
Gros
Rio de Janeiro