

ção, nalguns casos, as células neoplásicas situadas em contacto do tecido conjuntivo sofreriam uma maturação córnea, enquanto que as mais profundas permaneceriam indiferentes.

Orth também descreveu casos de calcificação e keratinização de células cancerosas, após compressão destas, exercida por tecido conjuntivo hiperplasiado, conduzindo o processo canceroso á uma cura espontânea.

Menetrier, Regaud e Baryon descrevem uma hiperplasia fibrosa em redor de certos tumores, como p. ex. o epitelioma plano cicatricial, de evolução muito lenta, e que eles atribuem a uma obliteração dos vasos linfáticos.

Termino aqui estas considerações parciais sôbre tão debatido, quão importante questão oncológica, cujo estudo desejo continuar na próxima sessão, trazendo á apreciação dos ilustres colegas, mais uma serie de argumentos contrários ao ponto de vista da inatividade conjuntiva pericancerosa.



ESTOMAGO

Aerofagia — Espasmos
Caimbras — Náuseas
Dispépsias Dolorosas
Hipercloridrias
E TODAS AS
DÔRES DO ESTOMAGO
são acalmadas instantaneamente com o

KAOBROL

que alivia sempre e evita o reaparecimento de todo o mal-estar:
O KAOBROL é prescrito pelo Corpo Medicinal Francês

Laboratórios J. LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine) França
Amostras e Brochuras: BARRENNE & Cia., 24, rua Antunes Maciel - RIO