

tebrais. Os sinais clinicos são a paraplegia e os dados radiologicos que mostram um pequeno tumor de contornos nitidos, de forma multi-lobulada. A exereses dá bons resultados.

Os tumores excepcionais são os lipomas, os fibromas periosticos, os osteomas e os cistos.

Para o diagnostico poucos elementos podem contribuir eficientemente, pois todos se apresentam clinicamente com os mesmos sintomas: dor ossea vaga, dor radicular e paraplegia. Só os angiomas têm um aspeto tipico: é a paraplegia sem dor, e o sinal radiologico. A radiografia mostra sempre um mesmo processo de destruição, com cifose, etc. Por vezes deve-se recorrer á biopsia sempre que possivel. A evolução tambem pode contribuir para o diagnostico.

O tratamento é diverso e a cirurgia muito tem progredido nesse sentido. O mieloma e o tumor de Ewing devem ser tratados pela Roëthgenterapia e uma laminectomia descompressiva. Em relação aos tumores benignos a cirurgia tem obtido os melhores successos.

E. P.



Injecções indolores
de
MERCURIO - CYCLOPHOSPHARGYRIO

A associação tónica corrige a acção depressora do mercurio
e combate a anemia secundaria da syphilis.
Uma injeção diaria ou em dias alternados.

Laboratorio Gross - Rio de Janeiro