

feita. Essa lesão pôde não evolver e extinguir-se, deixando sómente vestígios mínimos, quasi imperceptíveis. Mas, outras vezes, vai progredir, expandir-se, num ataque às primeiras barreiras que se antepõem à sua invasão. São então as linfadenites bronco-pulmonares e do mediastino a tradução d'um ataque mais sério, mais grave. Estas linfadenites têm um papel importantíssimo na disseminação hematogênica do B. de Koch.

De fato, o bacilo, levado pela linfa, vai atingir o canal torácico e a corrente circulatória, indo então localizar-se no corpo da vertebra, apto para o seu desenvolvimento. Não é indiferentemente que o bacilo atinge o corpo da vertebra, mas como sabemos, a porção sub-perióstica do corpo vertebral, é muito rica em vasos, daí ser esse fato invocado como facilitando a evolução do processo tuberculoso a esse nível. Depois devemos recordar, que, anatomicamente, a inserção das fibras periféricas do disco fibro-cartilaginoso nas vertebrae é extremamente sólida a ponto de "nos casos de esmagamento da coluna e nas fraturas indrétas, o tecido ósseo ceder antes do ligamento. Os discos parecem estas sob pressão permanente, porque, si fizermos um córte antero-posterior da coluna, eles fazem hernia para fóra do plano de secção". Tillaux.

A menor resistência do tecido esponjoso do corpo vertebral, irrigação sanguínea abundante, a pressão a que está submetido permanentemente, explicam a preferência da localização do bacilo nesse ponto, respeitando os arcos das vertebrae, que só excepcionalmente se apresentam os lesados.

Anatomia patológica: As lesões iniciais do Mal de Pott desenvolvem-se nos corpos vertebraes, poupando os discos interarticulares, que só mais tarde são também atingidos. Às vezes essa fase inicial se caracteriza pela formação de abcesso frio sub-perióstico, infiltração e caseificação das camadas superficiais; outras vezes, as lesões estão localizadas profundamente no tecido esponjoso do corpo da vertebra, dando lugar à formação de grandes cavernas, onde não é raro encontrar-se sequestro. E' sómente depois de um período, mais ou menos longo, que o disco se lesiona por sua vez e, como a pressão, devido ao peso do corpo a que estão submetidas as partes lesadas, é grande, ha destruição por ulceração compressiva dos corpos vertebraes, que achatam em fôrma de cunha de vértice anterior. As apófises articulares não cedem. Isso vai determinar uma angulação para adiante, com vértice posterior, que é a gibosidade.

FERROTRAT

(vidro com 250 cc.)

Suco concentrado de laranja ranja (Vitamina C.) - Extrato glicerinado de figado - Citrato de ferro amoniacal - Cobre - Cobalto - Manganês - Gluconato de cálcio - Fósforo, orgânico.

Clôro anemias (cloróse) Anemias em geral - Fraqueza em geral - Raquitismo - Perturbações do crescimento - Esgotamento em geral - Regenerador dos globulos vermelhos do sangue - Astenia post gripal.

ADULTOS: 1 colher das de sopa, 20 minutos antes das refeições.

CRIANÇAS: 1 colher das de sobremesa, 20 minutos antes das refeições.

MENORES: de 2 a 5 anos 1 colher das de chá às refeições.

Prodúto do Instituto Chimico Campinas