

13.º — VERTEBRA NEGRA — Afecção bastante rara, ainda pouco estudada e que "*é provavelmente uma manifestação paracancerosa*". (Lamy).

14.º — NEURALGIA DE BRODIE — O *Mal de Pott* histérico ou neuralgia de Brodie pôde às vezes oferecer grandes dificuldades de diagnóstico. Este é simplificado quando a doente é uma neuropata, pois nesse caso, a dor não será fixa e o exame radiológico nada apresentará de notável.

Tratamento — Sendo, como é o o Mal de Pott, "a manifestação local de uma doença geral", a instituição de um tratamento geral enérgico deve ser encarada com o máximo rigorismo. Todos os recursos terapêuticos empregados no tratamento da tuberculose encontram aqui sua indicação plena. Tratamento higiênico dietético, tratamento específico quando bem indicado, tratamento cirúrgico devem ser postos em execução com a máxima brevidade, para que o paciente possa tirar todo o resultado possível de sua aplicação. O repouso do paciente em posição decubitus dorsal, representa um papel importante no tratamento da tuberculose vertebral, devendo o doente permanecer nessa posição, durante todo o tempo de sua enfermidade. Esta posição é necessária afim de suprimir a compressão exercida sobre a vertebra lesada, bem como para diminuir a gibosidade. Mas, é preciso que, ao mesmo tempo, o paciente receba uma alimentação abundante e nutritiva, rica em vitaminas, com o que colocaremos nosso doente em condição de lutar com êxito contra sua afecção. A tuberculina parece dar resultados notáveis, e, si bem que não tenhamos grande número de observações sobre esse tratamento, podemos afirmar os ótimos resultados obtidos no nosso doente da observação I, com a *Neo-Tuberculina Fontes*, onde obtivemos a cicatrização completa das fístulas do abcesso e melhora notável do estado geral de N. S. Os abcessos póticos não devem ser incisados. Devemos empregar as punções evacuadoras, sem ou com injeções, como querem alguns, de líquido modificador, como o éter odiformado. Em caso de fístula, como aconteceu ao doente da I observação, além de manter-se a assepsia rigorosa da região, foram feitas aplicações de Raios Ultra-Violetas e, como referimos acima, tuberculinoterapia. As paraplegias, sendo resultantes da compressão e irritação da medula pelo abcesso intrarraquidiano, basta muitas vezes o simples

FERROTRAT

(caixa c/ 12 empôlas 3 cc.)

Cacodilato de ferro adicionado de traços de cobre, cobalto e manganês; monometilarseniato de sódio (arrhenal); sulfato de stricnina em soluto de Ringer.

Anemias em geral - Anemias secundárias às infecções - Anemias das verminoses - Anemias palúdicas - Anemias tóxicas e cancerosas - Anemias das avitaminoses (Beriberi, escorbuto) - Anemias dos últimos meses da gravidez - Anemias graves e perniciosas.

Injeção intramuscular.

Uma empôla diária.

FERROTRAT é o único injetável na América do Sul, com traços de cobre, cobalto e manganês.

Prodúto do Instituto Chimico Campinas