

BIBLIOGRAFIA

- BURNS AMBERSON, JR. — Patogen, and TRAIT. Tubere. Vert. — The Jour. Of BONE And JOINT SURGER. JUL. 1440.
- CALOT — Orthopedie indispensable. 7.^a Ed. Paris. — 1917.
- CEBALLOS, ALEXANDRE — Mal de Pott. EL DIA MEDICO N.º 25. Jun. 1940.
- FINKELSTEIN, H. — Tratado De Las Enfermedades Del Niño De Pecho. 2.^a Ed. LABOR. MADRID. 1932.
- KREMER, W-WIESE, O. — Tuberculosis de los huesos y articulaciones. Labor. Barcelona. 1937.
- MEYER, LEO — Critic. stud of spine tubere. in child. The Jour. Of Bone And Joint Surg. Jul. 1940.
- MEYERDING, W. HENRY — Spine tubere. Trait. Result. The Jour. Of Bone Joint Surg. Jul. 1940.
- OMBREDANNE, L. — MATHIEU P. — Traite de Chirurgie Orthopédique. Tom. III. Masson Cie. Paris. 1937.
- PROUST R. et SOUPAULT R. in BEGOUIN, P. — Path. Cir. Tom. II. Masson & Cie., Paris. 1938.
- ROMEIRO VIEIRA — Semiologia Médica, 5.^a Ed. Francisco Alves, Rio. 1933.
- SERGENT, RIBADEAU DUMAS, BABONNEIX — Trait. de Path. Med. & de Therp. Applique — Orthopédie — 2.^a Ed. Maloine. Paris. 1938.
- TAPIA, M. — Formas anatomoclínicas Diag. e Trat. de la Tubere. Pulm. Tom I. Artes gráficas, Porto. 1939.
- URENA, LOPEZ. — Afecciones del Raquis. Marata, Madrid. 1928.
- VALENTIN, B. — La necessité d'hospitaux spéciaux pour... Rev. Braz. Cir. n.º 5. 1939.
- WALKER, E. SWIFT. — Resul. Spine fusi. de Hibbs. The Jour. of Bone and Joint Surg. Jul. 1940.

ALCALITRAT

(Pó)

(vidro com 100 cc.)

Sal de viehi - Greda preparada - Carbonato de bismuto - Magnésia hidratada - Beladona em pó - Mucosa gástrica - Essência de aniz.

Sedativo das gastralgias - Gastrites - Duodenites - Hipercoridrias e nas displasias.

Uma colher das de chá 3 a 4 vezes ao dia, em meio copo d'água.

**Prodúto do
Instituto Chimico Campinas**

GLYCOTRAT

(caixa c/ 6 empôlas 10 cc.)

Açúcar de uva quimicamente puro - Hexametileno - tetramina em água bi-distilada.

Moléstias do fígado em geral e nas intoxicações - Angiololites - Insuficiência hepática - Colecistites - Ictericia - Uremias - Cirrose - Pielites - Cistites - Miocardites, etc.

1 empôla diariamente, sómente em uso endovenoso.

Para crianças administrar o conteúdo da empôla "per os", em um pouco d'água.

Prodúto do Instituto Chimico Campinas