

Notas terapeuticas

A quimica terá vencido o gonococo?

Arthur Vernes, Palazzoli e Rémy Giard — Archives de l'Institut Prophylactique, Paris, t. X, n.º 3, terceiro trimestre de 1938.

De início, os AA. ressaltam que, há 10 anos, o Instituto Profilático beneficia os seus doentes com as novas tendências terapêuticas.

Referem-se aos trabalhos de Domagk sobre os corantes azóicos, aos do casal Tréfouel, Nitti e Bovet que, naquele Instituto (laboratório de Química de Fournéau e laboratório de vacinas de Salimbeni), demonstraram que a parte ativa dos corantes azóicos reside na para-amino-fenil-sulfamida ou 1162 F.

Se, na verdade, a introdução do 1162 F. na terapêutica antigonocócica já constituía notável progresso, por outro lado, o seu uso em doses consideradas suficientes para o tratamento da blenorragia ocasionou, às vezes, fenômenos de intolerância (dores de cabeça, distúrbios gástricos, etc.).

Nessas condições, os AA. orientaram suas pesquisas para a utilização de corpos vizinhos do 1162 e prosseguiram suas experimentações em ligação direta com o casal Tréfouel e Bovet. Vários corpos vizinhos do 1162 F. mostraram-se ineficazes ou tóxicos. Contudo, três corpos mereceram dos AA. uma atenção particular: o 1399 F., o 1423 F. e o 693. Todos eles foram dados oralmente.

Das suas experimentações, os AA. concluem que o 1399 F. e o 1423 F., administrados sózinhos, são insuficientes nas doses máximas contra o gonococo. Podem, porém, dar belos resultados (70% de curas em menos de 20 dias), quando associados a tratamentos locais.

Quanto ao 693, conhecido por dagenan e que quimicamente é o alfa (para-amino-fenil-sulfamido) piridina, os seus resultados demonstraram cabalmente a sua superioridade sobre os dois precedentes. Usando-o sozinho, isto é, sem nenhuma associação de tratamento local, os AA. obtiveram, para casos recentes de blenorragia, 80% de curas em menos de 15 dias. Tiveram mesmo casos curados em 6 dias, usando a seguinte posologia:

3 gr. (6 comprimidos, 1 cada 2 horas), durante 2 dias;

2 gr. (4 comprimidos, 1 cada 3 horas), durante 2 dias;

1 gr. (2 comprimidos, 1 de manhã e outro à noite), durante mais 2 dias.

Desaparecimento do gonococo em 24 ou 48 horas. Urinas límpidas em 24 horas ou, quando muito, em 48 horas.

Em caso de insucesso, urina purulenta persistindo ainda no 4.º dia e gonococo no corrimento.

A brevidade e a extrema simplicidade do tratamento pelo dagenan evitam, ni homem, as complicações locais ou à distância. Quanto ao uso do dagenan, na mulher, os resultados parecem ser idênticos aos obtidos no homem.

Os AA. concluem afirmando que o 693 (dagenan) representa uma conquista notável contra o gonococo, mostrando também o importante serviço que a química presta na destruição desse micróbio.

GLYCOSORO

O melhor contra a fraqueza
organica, sobretudo quando
houver retenção chloretada
Uma injeção diaria ou em dias alternados

SÔRO GLYCOSADO
PHOSPHO-ARSENIADO
COM OU SEM
ESTRYCHNINA

Laboratório
Gros
Rio de Janeiro