

rios desvios: no sentido vertical, transversal ou frontal, constituindo tipos característicos da afecção traumática. A bexiga, a uretra, o réto, etc., podem ser feridos pelo traumatismo. Além dos sinais clínicos, a radiografia é um elemento de grande valia para revelar a natureza, o gráu, e a complicação da disjunção traumática da sínfise púbica, que deve ser distinguida de que sobrevem, algumas vezes, após o parto.

O A. occupou-se depois sôbre o tratamento, demorando-se na apreciação dos processos cirúrgicos e dos processos incruentos, para aconselhar os últimos em primeiro lugar, e só no seu fracasso é que se deverá tentar a intervenção cirúrgica para a redução do desvio. O prognóstico é geralmente bom. O resultado funcional é sempre bom em relação ao resultado anatômico, que raramente é completo. A radiografia sempre demonstra um desvio que não foi reduzido, apesar da melhor técnica empregada. O A. apresentou várias radiografias que foram estudadas minuciosamente onde foram visualizadas as diversas lesões antes e depois do tratamento”.

Como ninguém mais quizesse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, cuja áta foi por mim lavrada.

Pôrto Alegre, 19 de Maio de 1939.

Dr. Salvador Gonzales

2.º secretário

NEURILAN

*Poderoso calmante do
systema neuro-vegetativo.*

*Indicado na excitação nervosa,
nos desequilíbrios vegetativos,
tênicos, palpitações, insônia,
dyspepsia nervosa.*

*À base de estroncio bromado,
crataegus, leptolobium, meimandro.*

*Dose: 1 a 2 colheres das de chá em água
assucarada às refeições*

Lab. Gross-Rio

NÃO DEPRIMENTE

NEURILAN