

sempre é duradoura, em virtude dos fios ou agraíes romperem o osso ou serem mal tolerados pelo organismo. Acresce a isso a dificuldade do acto cirúrgico, prejudicado pelo acesso difícil á região, e embaraçado pela hemorragia e adiposidade que perturbam o campo operatório. A infecção pôde complicar o final da intervenção. Em ultima análise, os resultados são medíocres.

O mesmo não acontece com o tratamento ortopedico. Não oferece uma redução anatomica perfeita, mas o resultado funcional é sempre satisfatório. Além do mais é simples e inocuo.

O tratamento cirúrgico deve ser reservado para os casos de difficil redução, ou complicados por uma lesão visceral.

Nos casos em que persistirem posteriormente ao tratamento dôres fortes e impotencia funcional, que são quasi sempre provenientes da articulação sacro-iliaca, Lance realiza o bloqueio desta articulação por meio duma artrodese.

Bibliografía

M. MINAR — Un nouveau traitement de la disjonction pubienne. Rev. d'Ort. 1933, p. 689.

JEANNENEY et FOUCAULT — Disjonctions traumatiques de la symphise pubienne. in Rev. d'Ort. 1936, p. 560. Mém. Acad. Chir. t. LXII, n.º 10, p. 386.

INGELRANS et DECOULX — Disjonctions traumatiques de la symphise pubienne — XVIII réun. An. de la Soc. Franc., Rev. d'Ort. 1936, p. 649.

SARA SATANOWSKY e SAMUEL ZEIGUER — Disyunción traumática de la sínfisis púbica y de la articulación sacroílica — Rev. Ort. y Traum. B. Aires, 1938, p. 295.

NEURILAN

*Poderoso calmante do
sistema neuro-vegetativo.*

Indicado na excitação nervosa,
nos desequilíbrios vasosympa-
thicos, palpitações, insomnias,
dyspepsia nervosa.

A base de estroncio bromado,
crataegus, leptolobium, meimendo.

Dose: 1 a 2 colheres de chá em agua
assucarada ás refeições.

NAO DEPRIMENTE

NEURILAN

Lab. Gross-Rio