

de reativação aparente nos exames subsequentes, temos as observações análogas de *Barth e Kant*, que verificaram, numa grande série de casos que, persistindo a hipertensão, as modificações do liquor se acentuam paulatinamente.

O caso da observação XV foi incluído nesta série exclusivamente como exemplo da seguinte situação que entre nós não deve ser excecional: *coexistência de neuroles com tumor; no caso em aprêgo, com tumor típico do ângulo*. Fomos, neste caso, levados a admitir processo de natureza luética localizado no ângulo com a sintomatologia típica decorrente desta sede, casos como foram descritos por *Austregesilo*. Não tendo havido melhora após tratamento de prova, não hesitamos em indicar a intervenção.

De fato, baseando-se na experiência dos grandes neuro-cirurgiões americanos, é de boa praxe indicar a intervenção logo que não houver — após tratamento de prova durante 6 semanas — melhora importante, independente da natureza do processo. Ficou demonstrado pelas estatísticas desta escola que gomas cerebrais, quando existem, são pouco acessíveis ao tratamento medicamentoso, porém dão bons resultados, conforme a sede, quando operadas. Não nos cumpre entrar em mais detalhes.

(Continúa).

NEURILAN

*Poderoso calmante do
systema neuro-vegetativo.*

Indicado na excitação nervosa,
nos desequilíbrios vasosympo-
thicos, palpitações, insônia,
dyspepsia nervosa.

A base de estrôncio bromado,
crataegus, leptolobium, meimendo.

Dose: 1 a 2 colheres das de chá em água
assucarada às refeições.

NÃO DEPRIMENTE

NEURILAN

Lab. Gross-Rio