

„Clinique et Laboratoire“ —
Prof. André Jousset

Excepção feita ás lesões macroscópicas, ulcero-caseosas, que constituem a tuberculose cirurgica, a albuminuria é symptoma raro na evolução da tuberculose.

Quando existe corresponde a um dos grupos seguintes:

1.º Encontramo-nos em presença de doentes chegados á uma phase avançada de sua affecção, ora velhos tuberculosos portadores de antigos cavernas, ora individuos cacheticos atacados de tubere. osteo-articular antiga fistulada. E' o caso das suppurações chronicas. Trata-se de uma amylose renal acompanhada de depenerescencia amyloide de outras visceras.

2.º Doentes em começo do mal, apenas toucados pela infecção bacillar, onde se encontre uma albuminuria pouco abundante (1,50 gr.), sem cylindros. A estes casos corresponde a albuminuria *pretuberculosa*, denominação discutivel, a qual Jousset prefere a expressão de *albuminuria inicial*.

Demonstra, baseado em investigações ora histologicas, ora experimentaes que a albuminuria inicial é determinada pela presença do bacillo de Koch. Em grande numero de casos, disseminados na extensão do parenchyma renal, os bacillos escapam ás mais meticulosas investigações, sendo necessario recorrer á inoculação na cobaya.

Conclue o seguinte: todas as lesões, folliculares ou atypicas observadas nos rins dos tuberculosos e produzindo albuminuria, são consequencia da presença do bacillo de Koch.

R.

Exposição dos preparados da firma Johns Jürgens & Cia., no 9.º C. M. B.

