

doentinha convalescente de escarlatina, mas permaneceu cerca de meia hora no mesmo compartimento, e ao retirar-se essa senhora foi notado que uma pulga, proveniente das vestes da visitante, estava mordendo o rosto da criança. Cinco dias após sobreveio reacção febril de 39.º a 40.º com uma invasão de sarampo, typica, evoluindo com todo o cortejo classico de symptomas, quer no periodo eruptivo, quer no da descamação, com a nephrite caracteristica.

Quer a escarlatina, quer o sarampo não se propagaram a outras tres crianças menores, que cohabitavam com a doentinha no mesmo pavimento, sendo a prophylaxia exclusivamente aggressiva ás pulgas.

4.º — As escamas do sarampo e da escarlatina não provocam a molestia, mesmo reduzidas a polpa, com solução physiologica, e inoculadas em pessoas que nunca tiveram a molestia. Nesse sentido já foram effectuadas experiencias por Mayr (Dicc. Enciclopedico de Enlenburg VIII pg. 786, em relação ao sarampo).

5.º — Inoculações feitas com sangue do sarampo, no periodo eruptivo, deram resultado positivo, segundo Hebra, Home, Speranza e Chatona (op. c.) com o muco do pharynge igualmente, resultado positivo segundo Mayr (op. c.).

6.º — O sarampo e a escarlatina são molestias, que todos os auctores consignam que se propagam por meio de roupas de uso, transportadas de uma casa para a outra.

7.º — Os hygienistas consignam que as escolas são ponto da propagação de sarampo e escarlatina, no entanto nas escolas não ha contacto directo com doentes.

8.º — O sarampo é molestia universal, não tem preferencia para idades, nem sexos, nem raças. Quando o sarampo invade uma ilha, era desconhecido, ataca todas as pessoas. Entre centenas de exemplos citarei invasão do sarampo na Australia Meridional, onde fez mais de 20.000 victimas.

9.º — Nos paizes onde o sarampo é endemico a immuni-
dade dos adultos é devido a terem tido a molestia na infancia.

10.º — O inverno e a primavera são as quadras do anno em que evoluem as epidemias do sarampo e escarlatina, que desaparecem expontaneamente.

11.º — Na cidade de Montevidéo, em 1914, permittiu-se que ficassem em domicilio os doentinhos de sarampo, collocando-se na porta um aviso e fazendo-se rigoroso expurgo nesses domicilios, a epidemia foi mais curta e menor do que habitualmente.

Na Ilha de Paquetá um doentinho proveniente da cidade foi tratado, tendo em vista a destruição das pulgas no domicilio, a molestia não se propagou.

12.º — Na prophylaxia do sarampo e da escarlatina a destruição das pulgas no domicilio infectado deve constituir maximo cuidado no expurgo sanitario.

Farbwerke vorm, Meister Lucius & Bruening, Hoechst am Main

Unicos Representantes para o Brasil: John Juergens & Cia.

Rua da Alfandega, 120 — Rio de Janeiro

ALUMNOL

ANTISEPTICO INNOCUO

Efficaz contra inflamações e vegetações, affecções suppurativas, gonorrhêa e catarrhos.

Dóses : Gargarejo 0,25-1 ‰.

Solução antiseptica 0,5-3 ‰.

Na Urologia e Dermatologia 1-20 ‰.

AMPHOTROPIN

ANTISEPTICO VESICAL

Para uso interno com acção bactericida e diuretica promovendo a epithelisação.

Na cystite, 3 vezes por dia 0,5 gr.

Tubos originaes de 20 comprimidos a 0,5 gr.

ALBARGIN

ANTIGONORRHEICO

Altamente bactericida, não irritante, com acção profunda.

Uso prophylatico : solução de 5-10 ‰.

Uso therapeutico : solução de 0,1-3 ‰.

Tubos originaes de 20 e 50 comprimidos á 0,2 gr.

ALIVAL

Iodo Organico de vasto emprego

PRÓPRIEDADES :

Contém 63 ‰ de Iodo; facilmente solúvel, paladar agradável, para uso interno e externo, injectavel, reabsorção racional, polytropo.

INDICAÇÕES :

Syphilis secundaria e terciaria, Arteriosclerose, Asthma e em todos os casos em que a administração de Iodo é indicada.

DOSAGEM :

Internamente : 1 comprimido á 0, 3 gr. varias vezes por dia.

Externamente : Ungentos de 10-20 ‰.

Suppositorios de 1 gr. por via endovenas e intramuscular, 1 ampola á 1 gr.

Todos originaes de 10 comprimidos á 0,3 gr.

Literatura e amostras gratis aos Srs. Medicos

HEXOPHAN

ANTIARTHRITICO INSIPIDO

Diuretico e dissolvente de acido urico.

Internamente : 3 vezes por dia 1 gramma.

Subcutaneamente : 0,5 gr.

Caixinhas originaes de 10 a 20 comprimidos á 1 gr.

ANAESTHESIN

ANESTHESICO LOCAL

Com effeito prolongado.

Isento de toxidez e irritação contra dores traumaticas, gastralgias, etc.

Externamente : 0,25-0,5 gr. antes da refeição.

TUMENOL

ALCATRÃO SULFONADO

Preparado sem cheiro e não irritante empregado nas varias formas de eczema, acalma o prurido e impede a inflamação.

Dosagem : Ungentos de 1-20 ‰ ou tinturas para pincelar.

Formula melhor : Tumenol-Ammonio.